


Orquidopexia

Es una intervención quirúrgica para hacer descender los testículos dentro del escroto. Bajo circunstancias normales, los testículos en desarrollo de un feto crecen dentro del abdomen. Justo antes de nacer, los testículos se mueven hacia abajo dentro del escroto. En los casos de testículos no descendidos, éstos permanecen dentro del abdomen, incluso después del nacimiento.



Tratamiento

Platique con su doctor sobre el mejor plan de tratamiento para su hijo. Las opciones de tratamiento incluyen:

Darle tiempo al problema para que desaparezca por sí solo. En la mayoría de los niños, esto ocurre a los 4 meses de edad, sin ningún otro tipo de intervención.

Si los testículos no descienden por sí solos, el problema se puede corregir mediante la cirugía.

Esto se realiza mientras su hijo está dormido bajo anestesia.

No se conoce alguna manera para prevenir los testículos no descendidos, sin embargo, a medida que el niño con testículos no descendidos crece y madura, se pueden producir complicaciones que sí se pueden prevenir.

Éstos incluyen:

Infertilidad o cáncer testicular en la adultez.

Lesión a los testículos no descendidos.

Para mayor información

¡ACUDE A TU CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO!

¡RECUERDA: EL SEGURO POPULAR CUIDA Y PROTEGE TU SALUD!

