



## PREECLAMPSIA SEVERA



### ¿QUÉ ES LA PREECLAMPSIA?

Es una condición que ocurre **solo durante el embarazo y después de las 20 semanas de embarazo**.

Se presenta presión arterial alta, proteína en la orina, y a menudo se tiene inflamación (hinchazón) en las piernas, manos, cara o en todo el cuerpo.

En la pre eclampsia, los cambios arteriales disminuyen el suministro de sangre que llega al feto y la placenta, a los riñones, hígado, ojos, cerebro y otros órganos de la madre.

### SÍNTOMAS

- Dolor de cabeza.
- Cambios en la vista.
- Náuseas y dolor abdominal, por lo general en el abdomen superior.
- Dificultad para respirar.
- Dolor pélvico.
- Sangrado (hemorragia), en las encías o la vagina o sangre en la orina.



### TRATAMIENTO

- Dependerá del grado de **severidad** de la **preeclampsia** y de la **edad gestacional**.
- En general se indica inicialmente internación para realizar un estudio completo incluyendo estudios de laboratorio para sangre y orina, electrocardiograma materno y monitoreo fetal.
- Las pacientes con preeclampsia severa deberán ser internadas.
- Deberán mantener reposo.
- Tomar medicamentos para el control de la presión sanguínea y con ello evitar posibles convulsiones.
- Se realizarán controles de presión arterial frecuentes (al menos una vez al día), estudios de sangre y monitoreo del bebé.
- Si la enfermedad avanza, hay una alta probabilidad de adelantar el parto.

Las siguientes condiciones **aumentan la probabilidad** de que una mujer desarrolle **Preeclampsia** :

- Presión arterial alta crónica (prolongada)
- Obesidad
- Diabetes
- Enfermedad renal (en el riñón)
- Tener menos de 15 o más de 35 años
- Tener preeclampsia en embarazos anteriores
- Gestaciones múltiples (mellizos, trillizos o más)



EVITA LA PREECLAMPSIA EN EL EMBARAZO

¡ACUDE OPORTUNAMENTE A TU CENTRO DE SALUD!

RECUERDA: EL SEGURO POPULAR CUIDA Y PROTEGE TU SALUD

¡CUIDA TU SALUD Y LA DE TU BEBÉ!

**¡Pregunta!!**

