

Búsqueda personalizada

Usuario

.....

Ingresar

¿Olvidó su clave?
¿Olvidó su usuario?

Inicio | Directorio | Contacto | Mapa del Sitio | Ayuda

Buscar...

Ejemplar de hoyTrámitesServiciosLeyes y ReglamentosPreguntas Frecuentes

SI EL DOCUMENTO SE PRESENTA INCOMPLETO EN EL MARGEN DERECHO, ES QUE CONTIENE TABLAS QUE REBASAN EL ANCHO PREDETERMINADO. SI ES EL CASO, HAGA CLICK AQUÍ PARA VISUALIZARLO CORRECTAMENTE.

DOF: 12/02/2018

EDICIÓN 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Nutriología.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción I, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción I, 26, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.

Que conforme al artículo 58, numeral 6, del ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado el 14 de julio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, la edición anual del Cuadro básico y Catálogo de insumos del Sector Salud incluye como uno de sus libros el Cuadro Básico y Catálogo de Nutriología.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la edición 2017, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2017.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que en reunión del 10 de noviembre de 2009, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó la modificación de la clave a 12 dígitos, con la finalidad de identificar las diferentes presentaciones del envase con los dos últimos dígitos, así como también uniformar la información en la adquisición de insumos por las instituciones.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector salud expide la siguiente:

EDICION 2017 DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO DE NUTRIOLOGIA			
Cuadro Básico y Catálogo de Nutriología			
Cuadro Básico			
ACIDO ASCORBICO			
Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2707.00	TABLETA Cada tableta contiene: Acido ascórbico 100 mg. Envase con 20 tabletas.	Profilaxis o tratamiento de deficiencia de vitamina C. Acidificante urinario. Antioxidante.	Oral. Adultos: 100-300 mg en 24 horas. Niños: 50 mg en 24 horas.
ACIDO FOLICO			
Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.1706.00 010.000.1706.01	TABLETA Cada tableta contiene: Acido fólico 5 mg. Envase con 20 tabletas. Envase con 92 tabletas.	Prevención y tratamiento de anemias megaloblásticas por deficiencia de ácido fólico.	Oral. Adultos y niños mayores de 5 años: 2.5 a 5 mg por día.
010.000.1700.00	TABLETA Cada tableta contiene: Acido fólico 4 mg. Envase con 90 tabletas.	Antecedentes de embarazos con productos con alteraciones del tubo neural: Espina bífida Meningocele.	Oral. Adultos: 4 mg/día Tres meses previos al embarazo y las primeras 12 semanas del desarrollo fetal.
010.000.1711.00	TABLETA Cada tableta contiene: Acido fólico 0.4 mg. Envase con 90 tabletas.	Mujeres en edad reproductiva, para prevenir defectos del cierre del tubo neural.	Oral. Adultos: Una tableta cada 24 horas, durante tres meses previos al embarazo hasta 12 semanas de gestación.
ALIMENTO MEDICO PARA MENORES DE UN AÑO CON ACIDEMIA ISOVALERICA Y OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA LEUCINA			
Clave	Descripción POLVO	Indicaciones	Vía de administración y dosis

CONSULTA POR FECHA

Feb 2018

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

Crear Usuario

Búsqueda Avanzada

Novedades

Top Notas

Quejas y Sugerencias

Obtener Copia del DOF

Publicaciones Relevantes

Verificar Copia del DOF

Enlaces Relevantes

Contáctenos

Filtros RSS

Historia del Diario Oficial

Estadísticas

Vacantes en Gobierno

Ex-trabajadores Migratorios

Traducir esta página

Indisponible

La traducción es automática y puede contener errores o inconsistencias

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 02/10/2019

DOLAR

UDIS

19.7792

6.292866

TIIE 28 DIAS

TIIE 91 DIAS

8.0150%

7.9275%

Ver más

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

No

Si

Votar

010.000.5411.00	Contenido en:	Unidades	100 g		Pacientes con trastornos del metabolismo de la leucina.	Oral. Niños menores de un año: Dosis: Según la indicación del especialista.
			Mínimo	Máximo		
	Energía	kcal	475	500		
	Proteína	g	13.00	16.20		
	Carnitina	mg	0	900		
	Taurina	mg	0	40		
	Glutamina	g	0	0.11		
	Glicina	g	1.00	2.19		
	Hidratos de carbono	g	51	54		
	Lípidos	g	21.70	26		
	L-Cistina	g	0.15	0.44		
	L-Histidina	g	0.42	0.70		
	L-Isoleucina	g	0.42	0.58		
	L-Leucina	g	0	traza		
	L-Lisina	g	1.00	1.51		
	L-Metionina	g	0.26	0.41		
	L-Fenilalanina	g	0.78	0.88		
	L-Treonina	g	0.70	0.87		
	L-Triptófano	g	0.17	0.34		
	L-Tirosina	g	0.78	0.89		
	L-Valina	g	0.41	0.63		
	Tiamina (B1)	mg	0.39	1.9		
	Riboflavina (B2)	mg	0.6	1		
	Niacina (B3)	mg	4.50	12.80		
	Piridoxina (B6)	mg	0.52	1.00		
	Cianocobalamina (B12)	µg	1.25	4.90		
	Acido fólico	µg	38	230		
	Acido pantoténico	µg	2650	6900		
	Acido ascórbico (vit.C)	mg	40	60		
	Colina	mg	50	80		
	Biotina	µg	26	65		
	Inositol	mg	40	100		
	Vitamina A	µg	420	528		
	Vitamina D	µg	7.50	9.5		
	Vitamina E	mg	3.3	14.94		
	Vitamina K	µg	21	50		
	Sodio	mg	120	240		
	Potasio	mg	420	675		
	Cloro	mg	290	480		
	Calcio	mg	325	660		
	Fósforo	mg	230	440		
	Magnesio	mg	34	66		
	Hierro	mg	7	9.6		
	Cobre	µg	450	1100		
	Cromo	µg	0	15		
	Zinc	mg	5	8.6		
	Manganeso	mg	0.38	0.6		
	Yodo	µg	47	76		
	Molibdeno	µg	0	35		
	Selenio	µg	14.1	20		
	Envase					



ALIMENTO MEDICO PARA NIÑOS DE 1 A 8 AÑOS CON ACIDEMIA ISOVALERICA Y OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA LEUCINA

Clave	Descripción POLVO				Indicaciones	Vía de administración y dosis
010.000.5412.00	Contenido en:	Unidades	100 g		Pacientes con trastornos del metabolismo de la leucina.	Oral. Niños de 1 a 8 años: Dosis: Según la indicación del especialista.
			Mínimo	Máximo		
	Energía	kcal	309	500		
	Proteína	g	16.2	30.00		
	Carnitina	mg	0	1800		
	Taurina	mg	0	100		
	Glutamina	g	0	0.33		
	Hidratos de carbono	g	35	51		
	Lípidos	g	0	26		
	L-Cistina	g	0.29	0.86		
	L-Histidina	g	0.47	1.35		
	L-Isoleucina	g	0.58	0.86		
	L-Leucina	g	0	traza		
	L-Lisina	g	1.51	2.05		
	L-Metionina	g	0.30	0.60		
	L-Fenilalanina	g	0.78	1.76		
	L-Treonina	g	0.87	1.40		
	L-Triptófano	g	0.34	0.53		
	L-Tirosina	g	0.78	1.78		
	L-Valina	g	0.63	0.96		
	Glicina	g	1.1	4.20		
	Tiamina (B1)	mg	1.0	3.25		
	Riboflavina (B2)	mg	1.0	1.80		
	Niacina (B3)	mg	10	21.7		
	Piridoxina (B6)	mg	1.00	1.40		
	Cianocobalamina (B12)	µg	2.00	5.00		
	Acido fólico	µg	100	430		
	Acido pantoténico	µg	3700	8000		
	Acido ascórbico (vit.C)	mg	60	135		
	Colina	mg	60	110		
	Biotina	µg	38	120		
	Inositol	mg	55.5	86		
	Vitamina A	UI	1520	2200		
	Vitamina D	UI	300	480		
	Vitamina E	mg	4.35	14.94		
	Vitamina K	µg	30	60		
	Sodio	mg	240	880		
	Potasio	mg	580	1370		
	Cloro	mg	450	940		
	Calcio	mg	660	880		
	Fósforo	mg	440	810		
	Magnesio	mg	66	225		
	Hierro	mg	9.6	13.00		
	Cobre	µg	860	1800		

Cromo	µg	0	40
Zinc	mg	8.6	13
Manganeso	mg	0.38	1.60
Yodo	µg	76	100
Molibdeno	µg	0	100
Selenio	µg	14.1	40
Envase			

ALIMENTO MEDICO PARA NIÑOS DE 8 AÑOS A ADULTOS CON ACIDEMIA ISOVALERICA Y OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA LEUCINA

Clave	Descripción POLVO				Indicaciones	Vía de administración y dosis
010.000.5413.00	Contenido en:	Unidades	100 g		Pacientes con trastornos del metabolismo de la leucina.	Oral. Adultos y niños de 8 años y mayores: Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	297	500		
	Proteína	G	16.2	39.00		
	Carnitina	mg	0	1800		
	Taurina	mg	0	150		

	Glutamina	g	0	0.33		
	Hidratos de carbono	g	34.00	51.00		
	Lípidos	g	0	26.00		
	L-Cistina	g	0.29	1.4		
	Glicina	g	1.1	6.60		
	L-Histidina	g	0.47	2.1		
	L-Isoleucina	g	0.58	1.3		
	L-Leucina	g	0	Traza		

L-Lisina	g	1.51	3.20
L-Metionina	g	0.41	0.90
L-Fenilalanina	g	0.78	2.50
L-Treonina	g	0.87	2.20
L-Triptófano	g	0.34	0.83
L-Tirosina	g	0.78	2.40
L-Valina	g	0.63	1.50
Tiamina (B1)	mg	1.00	3.25
Riboflavina(B2)	µg	1.00	1.80
Niacina (B3)	mg	10.00	27.4
Piridoxina (B6)	µg	1000	2100
Cianocobalamina (B12)	µg	2.00	5.00
Acido fólico	µg	100	500
Acido pantoténico	µg	3800	8000
Acido ascórbico (vit.C)	mg	60	90
Colina	mg	60	321
Biotina	µg	38	140
Inositol	mg	70.00	86.00
Vitamina A	UI	1520	2364
Vitamina D	UI	300	380
Vitamina E	mg	5.2	14.94
Vitamina K	µg	40	70
Sodio	mg	240	880
Potasio	mg	580	1370
Cloro	mg	480	940
Calcio	mg	660	880
Fósforo	mg	440	760
Magnesio	mg	66	285
Hierro	mg	9.6	23.5
Cobre	µg	860	1400
Cromo	µg	0	50.00
Zinc	mg	8.60	13.60
Manganeso	mg	0.380	2.10
Yodo	µg	76	107
Molibdeno	µg	0	107
Selenio	µg	14.1	50.00
Envase			

CASEINATO DE CALCIO

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.0022.00	POLVO Cada 100 g contienen: Proteínas 86.0 a 90.0 g. Grasas 0.0 a 2.0 g. Minerales 3.8 a 6.0 g. Humedad 0.0 a 6.2 g. Envase con 100 g.	Pacientes que requieren complementar el requerimiento proteico.	Oral. Niños y adultos: De acuerdo con los requerimientos del paciente.

COMPLEJO B

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2714.00	TABLETA, COMPRIMIDO O CAPSULA Cada tableta, comprimido o cápsula contiene: Mononitrato o clorhidrato de Tiamina 100 mg. Clorhidrato de piridoxina 5 mg. Cianocobalamina 50 µg. Envase con 30 tabletas, comprimidos o cápsulas.	Deficiencia o requerimientos incrementados de tiamina. Deficiencia o requerimientos incrementados de piridoxina Deficiencia o requerimientos incrementados de cianocobalamina.	Oral. Niños y adultos: De acuerdo con los requerimientos del paciente.

DIETA POLIMERICA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO O PROTEINAS, GRASAS, VITAMINAS, MINERALES

Clave	Descripción POLVO				Indicaciones	Vía de administración y dosis
010.000.2739.00	Cada 100 gramos contiene:	Unidad	Mínimo	Máximo	Para cubrir los requerimientos nutricionales o para complementarlos.	Oral o por sonda enteral. Niños y adultos: Dosis: de acuerdo al requerimiento.
	Densidad energética	Kcal/ml	0.99	1.06		
	Calorías	Kcal	412.5	441.7		
	Hidratos de carbono	g	58.50	68.00		
	Proteína:	g	15.80	17.50		

Histidina	g	0.40	0.5600
Isoleucina	g	0.7035	1.0135
Leucina	g	1.4050	1.7670
Lisina	g	1.1080	1.4525
Metionina	g	0.3925	0.5256
Fenilalanina	g	0.7810	0.9450
Treonina	g	0.6466	0.8050
Triptofano	g	0.1833	0.2450
Valina	g	0.8553	1.2950
Arginina	g	0.6165	0.6650
Acido aspártico	g	1.0500	1.2310
Serina	g	0.8750	0.8910
Acido glutámico	g	3.0100	3.3530
Prolina	g	1.4700	1.5630
Glicina	g	0.2800	0.3380
Alanina	g	0.4375	0.4910
Cistina	g	0.0980	0.7000
Tirosina	g	0.7414	1.0150
Grasas	g	9.0	15.80
Acidos grasos saturados	g	0.96	2.30
Acido palmítico	g	0.67	1.77
Acido esteárico	g	0.29	0.36
Grasos insaturados	g	7.20	12.62
Linoleico	g	5.8	8.50
Linolénico	g	0.20	0.20
Oleico	g	1.20	4.00
Relación polinsaturados/saturados	g	0.11	8.20
Colesterol	g	0.00	0.02
Vitamina A	U.I.	1028.0	1170.0
Vitamina D	U.I.	90.10	96.00
Vitamina E	mg	10.20	15.00
Acido ascórbico	mg	20.00	68.00
Acido fólico	µg	122.00	200.00
Tiamina	mg	0.70	0.72
Riboflavina	mg	0.70	0.80
Niacina	mg	9.00	10.00
Vitamina B6	mg	0.90	1.00
Vitamina B12	µg	2.70	3.10
Biotina	µg	61.00	150.00
Acido pantoténico	mg	2.40	5.00
Vitamina K	µg	18.00	44.10

	Colina	mg	0.0	136.00		
	Calcio	mg	225.20	325.20		
	Fósforo	mg	225.20	268.80		
	Yodo	µg	34.00	44.00		
	Hierro	mg	4.10	5.00		
	Magnesio	mg	90.10	105.00		
	Cobre	mg	0.50	0.52		
	Zinc	mg	4.30	5.40		
	Manganeso	mg	0.90	1.20		
	Potasio	mg	515.00	860.00		
	Sodio	mg	130.00	360.00		
	Cloro	mg	300.00	610.00		
	Selenio	µg	0.0	19.00		
	Cromo	µg	0.0	22.5		
	Molibdeno	µg	0.0	38.00		
	Envase con 400 - 454 gramos con o sin sabor.					

FORMULA DE PROTEINA AISLADA DE SOYA

Clave	Descripción POLVO								Indicaciones	Administración y dosis
030.000.0021.00	Contenido en	Unidad	100 g		100 kcal		100 ml		Diarrea aguda con intolerancia secundaria a la lactosa. Deficiencia primaria de lactasa. Galactosemia. Alergia a la proteína de la leche de vaca mediada por IgE.	Oral. Niños de 0-5 meses de edad: 110 kcal/kg de peso corporal. Niños > 5 a 12 meses de edad: 90 kcal/kg de peso corporal.
	Kilocalorías	kcal	515.0	524.00	60.00	70.00	66.67	68.00		
	Lípidos	g	20.00	28.30	4.40	6.00	3.60	3.70		
	Acido docosa-hexaenoico (DHA)	mg			0.00	12.00				
Acido docosa-hexaenoico (DHA)	%			0.22	0.30					
Acido araquidónico (ARA)	mg			0.00	12.00					
Acido araquidónico (ARA)	%			0.22	0.30					
Relación DHA/ARA				1:1	1:1					
Acido linoléico	g			0.30	1.40					
Acido alfa linoléico	mg			50.00	SE					
Acido alfa linoléico	%			0.00	3.00					
Relación Acido linoléico/ Acido alfa linoléico				5:1	15:1					
Proteínas	g	13.70	15.60	2.64	3.00	1.80	2.00			
Taurina	mg	0.00	36.00	0.00	12.00	0.00	4.60			
Hidratos de carbono	g	51.00	54.00	10.00	14.00	6.60	6.90			
Sodio	mg	140.00	243.00	27.00	47.00	18.00	32.00			
Potasio	mg	525.00	629.00	100.00	120.00	65.00	81.12			
Cloruros	mg	315.00	449.00	60.00	86.90	40.00	59.00			
Calcio	mg	420.00	532.00	80.00	140.00	54.00	70.00			
Fósforo	mg	210.00	393.00	40.00	75.00	27.00	50.70			
Relación Calcio/ Fosforo				1:1	2:1					
L-carnitina	mg	0.00	12.00	1.20	2.30	0.00	1.50			
Vitamina A		1572.00 UI	2000.00 UI	90.00 µg	180.00 µg	202.80 UI	263.00 UI			

Vitamina D		304.00 UI	350.00 UI	1.50 µg	2.50 µg	40.00 UI	44.00 UI
Vitamina E		10.50 UI	19.40 UI	2.24 mg	5.00 mg	1.35 UI	2.57 UI
Vitamina K	µg	40.00	76.00	8.00	25.00	5.00	10.00
Vitamina C	mg	53.00	68.00	10.30	30.00	7.00	9.00
Vitamina B1 (tiamina)	µg	300.00	758.00	60.00	150.00	40.00	100.00
Vitamina B2 (riboflavina)	µg	456.00	1136.00	80.00	225.00	60.00	150.00

Niacina	µg	3000.00	5300.00	600.00	1500.00	400.00	700.00
Vitamina B6 (piridoxina)	µg	300.00	455.00	58.80	90.00	40.00	60.00
Acido fólico	µg	61.00	100.00	12.00	50.00	8.00	13.20
Acido pantoténico	µg	2000.00	3800.00	400.00	750.00	300.00	500.00
Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg	1.50	2.30	0.10	0.50	0.20	0.30
Biotina	µg	12.00	27.00	1.50	7.50	1.50	3.50
Colina	mg	55.00	63.00	10.00	50.00	7.00	8.50
Inositol	mg	25.80	89.00	5.00	40.00	3.40	11.50
Magnesio	mg	40.00	58.00	7.50	15.00	5.00	7.44
Hierro	mg	6.30	9.40	1.20	2.00	0.80	1.20
Yodo	µg	76.00	105.00	14.70	50.00	10.00	13.00
Cobre	µg	315.00	424.00	60.00	84.00	40.00	56.00
Zinc	mg	4.50	6.00	0.90	1.20	0.49	0.81
Manganeso	µg	131.00	304.00	5.00	50.00	16.90	40.00
Selenio	µg			1.00	9.00		
Dilución 13.00 - 13.70 %							
Envase de lata con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g.							

FORMULA DE PROTEINA HIDROLIZADA DE ARROZ ETAPA 1

Clave	Descripción POLVO				Indicación	Vía de administración y dosis
030.000.5952.00	CONTENIDO EN:	UNIDAD	Por 100 Kcal	Por 100 g de polvo	Alergia a la proteína de la leche de vaca	Oral. Lactantes de 0 a 6 meses de edad con necesidades especiales de nutrición por alergia a la proteína de la leche de vaca. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía*	kcal	100	504		
	Proteínas	g	2,4	12,0		
	Hidratos de carbono	g	11,3	56,7		
	Lípidos	g	5,0	25,5		
Nucleótidos	mg	4,3	21,6			
Azúcares	g	0,0	0,0			
Maltodextrina	g	8,9	44,7			
Almidón precocido de maíz	g	2,4	12,0			
Lactosa	g	0,0	0,0			
Grasa saturada	g	2,6	13,3			
Acidos grasos trans	mg	0,0	0,0			
Acidos grasos monoinsaturados	g	1,6	8,1			
Acidos grasos poliinsaturados	g	0,8	4,1			
Colesterol	mg	0,0	0,0			
Triglicéridos de cadena media	g	1,1	5,4			
Acido linoléico	mg	652,4	3290			
Acido α- linoléico	mg	55,7	281			
Fibra dietética	g	0,0	0,0			
Minerales	mg	500	2500			
Colina	mg	9,9	50			
Taurina	mg	6,9	35			
Mioinositol	mg	5,0	25			
L. carnitina	mg	2,0	10			
Sodio (Na)	mg	45	225			
Potasio (K)	mg	89	450			
Cloro (Cl)	mg	65	330			
Calcio (Ca)	mg	89	450			
Fósforo (P)	mg	50	250			
Magnesio (Mg)	mg	8,9	45			
Hierro (Fe)	mg	1,0	5,0			
Zinc (Zn)	mg	0,79	4,0			
Cobre (Cu)	µg	63	320			
Manganeso (Mn)	µg	29,7	150			
Yodo (I)	µg	19,8	100			
Selenio (Se)	µg	2,0	10,0			
Relación Calcio/ Fósforo	N/A	1,8:1	1,8:1			

Vitamina A (expresado en retinol)	µg	89	450
Vitamina D	µg	1,5	7,5
Vitamina E (alfa tocoferol)	mg	2,0	10,0
Vitamina K1	µg	7,9	40
Vitamina B1	µg	99,1	500
Riboflavina B2	µg	119	600
Piridoxina B6	µg	79,3	400
Cianocobalamina B12	µg	0,2	1,0
Vitamina C (ácido ascórbico)	mg	13,9	70
Acido fólico (B9)	µg	11,9	60
Acido Pantoténico (B5)	µg	635	3200
Niacina (B3)	µg	991	5000
Biotina (H)	µg	2,4	12
5'monofosfato de citidina	mg	1,6	8,1
5'monofosfato de uridina	mg	1,3	6,5

5'monofosfato de adenosina	mg	0,6	3,0
5'monofosfato de guanosina	mg	0,4	2,0
5'monofosfato de inosina	mg	0,4	2,0
*100 mililitros de producto aportan 68 Kcal Envase de lata con 400 g y medida dosificadora de 4.5 g.			

FORMULA DE PROTEINA HIDROLIZADA DE ARROZ ETAPA 2

Clave	Descripción POLVO				Indicación	Vía de administración y dosis
030.000.5951.00	CONTENIDO EN:	UNIDAD	Por 100 Kcal	Por 100 g de polvo	Alergia a la proteína de la leche de vaca	Oral. Lactantes de 6 a 12 meses de edad con necesidades especiales de nutrición por alergia a la proteína de la leche de vaca. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía*	Kcal	100	484		
	Proteínas	g	3,1	15,0		
	Hidratos de carbono	g	11,7	56,5		
	Lípidos	g	4,5	22,0		
	Nucleótidos	mg	4,3	20,3		
	Azúcares	g	0,0	0,0		
	Maltodextrina	g	9,2	44,5		
Almidón precocido de maíz	g	2,5	12,0			
Lactosa	g	0,0	0,0			
Grasa saturada	g	2,4	11,4			
Acidos grasos trans	mg	0,0	0,0			
Acidos grasos monoinsaturados	g	1,4	7,0			
Acidos grasos poliinsaturados	g	0,7	3,6			
Colesterol	mg	0,0	0,0			
Triglicéridos de cadena media	g	1,0	4,8			
Acido linoléico	mg	600	2904			
Acido α-linolénico	mg	52,3	253			
Fibra dietética	g	0,0	0,0			
Minerales	mg	700,0	3500			
Colina	mg	10,3	50			
Taurina	mg	6,9	35			
Mioinositol	mg	5,2	25			
L. carnitina	mg	2,1	10			
Sodio (Na)	mg	57	275			
Potasio (K)	mg	128	620			
Cloro (Cl)	mg	103	500			
Calcio (Ca)	mg	103	500			
Fósforo (P)	mg	68,2	330			
Magnesio (Mg)	mg	10,3	50			
Hierro (Fe)	mg	1,5	7,5			
Zinc (Zn)	mg	0,83	4,0			
Cobre (Cu)	µg	68	330			
Manganeso (Mn)	µg	31,0	150			
Yodo (I)	µg	20,7	100			
Selenio (Se)	µg	2,1	10			
Relación Calcio/ Fósforo	N/A	1,5:1	1,5:1			

Vitamina A (expresado en retinol)	µg	93	450,0
Vitamina D	µg	1,5	7,5
Vitamina E (alfa tocoferol)	mg	2,1	10,0
Vitamina K1	µg	8,7	42,0
Vitamina B1	µg	107,4	520
Riboflavina B2	µg	128	620
Piridoxina B6	µg	86,8	420
Cianocobalamina B12	µg	0,2	1,0
Vitamina C (ácido ascórbico)	mg	14,5	70
Acido fólico (B9)	µg	12,4	60
Acido Pantoténico (B5)	µg	661	3200
Niacina (B3)	µg	1033	5000
Biotina (H)	µg	2,5	12,0
5'monofosfato de citidina	mg	1,6	7,7
5'monofosfato de uridina	mg	1,3	6,2
5'monofosfato de adenosina	mg	0,6	2,8
5'monofosfato de guanosina	mg	0,4	1,8
5'monofosfato de inosina	mg	0,4	1,8
*100 mililitros de producto aportan 68 Kcal Envase de lata con 400 g y medida dosificadora de 4.7 g.			

FORMULA DE SEGUIMIENTO O CONTINUACION

Clave	Descripción								Indicaciones	Vía de administración y dosis
030.000.0014.00	POLVO									
	Contenido en	Unidad	100 g		100 kcal		100 ml		Alimentación en lactantes.	Oral. Niños de 6 a 12 meses de edad: 90 kcal/kg de peso corporal.
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
	Energía	kcal	476.00	526.00	60.00	85.00	66.67	68.00		
	Lípidos	g	20.00	28.90	3.00	6.00	2.80	3.71		
	Acido linoleico	g			0.30	1.20				
	Acido - á linolénico	mg			50	160				
	Acido - á linolénico	%			1.19	2.90				
	Relación Linoleico-Linolénico				5:1	16:1				

	Proteínas	g	11.80	15.90	3.00	5.50	1.50	2.21	
Hidratos de carbono	g	54.60	59.00	10.39	14.00	7.00	8.20		
Sodio	mg	126.00	210.00	23.95	44.00	16.00	28.50		
Potasio	mg	552.00	650.00	80.00	135.00	71.00	90.00		
Cloruros	mg	341.00	420.00	64.82	87.00	44.00	58.00		
Calcio	mg	410.00	550.00	77.94	114.00	53.00	76.00		
Fósforo	mg	221.00	395.00	42.01	82.00	28.00	55.00		
Relación Calcio/ Fósforo				1:1	2:1				
Vitamina A		1577.00 UI	1900.00 UI	90.00 µg	180.00 µg	202.80 UI	270.00 UI		
Vitamina D		315.00 UI	430.00 UI	1.50 µg	2.50 µg	40.50 UI	60.00 UI		
Vitamina E		5.80 UI	16.00 UI	2.47 µg	5.00 µg	0.80 UI	2.10 UI		
Vitamina K	µg	22.00	48.00	4.50	8.00	3.00	6.67		
Vitamina C	mg	47.00	48.00	8.00	10.00	6.00	6.70		
Vitamina B1 (tiamina)	µg	526.00	720.00	100.00	150.00	68.00	100.00		
Vitamina B2 (riboflavina)	µg	768.00	1200.00	80.00	240.00	101.00	160.00		
Niacina	µg	4401.30	13000.00	300.00	2700.00	610.00	1800.00		
Vitamina B6 (piridoxina)	µg	315.00	960.00	45.00	200.00	40.00	130.00		
Acido fólico	µg	43.00	140.00	10.00	50.00	6.00	20.00		
Acido pantoténico	µg	1732.00	3400.00	400.00	700.00	240.00	470.00		
Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg	0.80	1.31	0.18	0.25	0.13	0.17		
Biotina	µg	12.00	23.00	2.60	7.50	1.70	3.00		
Colina	mg	34.00	84.00	7.00	50.00	4.67	11.00		
Inositol	mg	0.00	25.00	4.00	40.00	0.00	3.30		
Magnesio	mg	32.00	47.00	6.00	15.00	4.00	6.67		
Hierro	mg	8.20	9.50	1.70	2.00	1.10	1.22		
Yodo	µg	32.00	100.00	6.00	21.00	4.00	14.00		
Cobre	µg	418.00	580.00	60.00	80.00	56.67	80.00		
Zinc	mg	3.60	5.80	0.75	1.20	0.50	0.80		
Manganeso	µg	26.00	72.00	5.00	15.00	3.00	10.00		
Selenio	µg			1	9				
Nucleótidos*	*Opcionales								
Dilución de 12.86% a 13.90%.									
Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.63 g.									

MIEL DE MAIZ

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.0091.00	SOLUCION Cada 5 ml contienen: Miel de maíz 3.75 g. Envase con 500 ml.	Complementación de requerimiento de hidratos de carbono.	Oral. Niños y adultos: Dosis de acuerdo a los requerimientos.

PIRIDOXINA

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5232.00	TABLETA Cada tableta contiene: Piridoxina 300 mg. Envase con 10 tabletas.	Deficiencia de vitamina B6. Profilaxis de neuritis en pacientes con tratamiento de isoniazida. Crisis convulsivas por dependencia de piridoxina. Anemia sideroblástica.	Oral. Adultos 50 a 500 mg.

MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES

Clave	Descripción	Indicaciones	Administración y dosis
010.000.5383.00	JARABE Cada 5 ml contienen: Vitamina A 2 500 UI. Vitamina D2 200 UI. Vitamina E 15.0 mg. Vitamina C 60.0 mg. Tiamina 1.05 mg. Riboflavina 1.2 mg. Piridoxina 1.05 mg. Cianocobalamina 4.5 µg. Nicotinamida 13.5 mg. Hierro elemental 10.0 mg. Envase con 240 ml y dosificador.	Prevención y tratamiento de deficiencias específicas.	Oral. Adultos: 5 ml cada 24 horas. Niños: 2.5 ml cada 24 horas.
010.000.4376.00	TABLETA, CAPSULA O GRAGEA Cada tableta, cápsula o gragea contiene: Clorhidrato de tiamina. (vitamina B1) 5.0 a 10.0 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.5 a 10.0 mg. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2.0 a 5.0 mg. Nicotinamida (niacinamida) 10.0 a 100.0 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 3.0 a 5.0 µg. Acetato de alfatocoferol (vitamina E) 3.0 a 20.0 mg. Retinol (vitamina A) 2000.0 a 10000.0 UI. Colesterol (vitamina D3) 200.0 a 1000.0 UI. Ácido pantoténico 2.0 a 7.0 mg. Sulfato ferroso 15.0 a 60.0 mg. Sulfato de cobre 1.0 a 4.0 mg. Yoduro o fosfato	Oral. Adultos: 1 tableta, cápsula o gragea cada 24 horas.	

de potasio	0.15 a 4.0 mg.
Glicerofosfato, sulfato	
o hiposulfito de magnesio	1.0 a 8.00 mg.
Fosfato de magnesio	5.0 a 133.0 mg.
Cloruro, fosfato o sulfato	
de zinc	3.0 a 25.0 mg.
Envase con 30 tabletas, cápsulas o grageas.	

SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE PRETERMINO

Clave	Descripción POLVO								Indicaciones	Administración y dosis
	Contenido en	Unidad	100 g		100 kcal		100 ml		Alimentación en prematuros.	Oral o sonda enteral. Niños prematuros: 90 kcal/ kg de peso corporal / día.
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
	Kilocalorías	kcal	400	525	100.0	100.0	64	85		
	Lípidos	g	19.2	31.5	4.80	6.00	3.072	5.1		
	Acido linoleico	mg	1200	7350	300.00	1400.00	192	1190		
	Ac alfa Linoléico	mg	200	SE*	50.00	SE*	32	SE*		
	Relac A. Linoleico/ A. á Linolenico		5:1	15:1	5:1	15:1	5:1	15:1		
	Acido araquidónico	%	1.60	3.675	0.40	0.70	0.256	0.595		
	Acido DHA**	%	1.40	2.625	0.35	0.50	0.224	0.425		
	Relac Aa/DHA		1.5:1	2:1	1.5:1	2:1	1.5:1	2:1		
	Proteínas	g	9.60	15.75	2.40	3.00	1.536	2.55		
	Taurina	mg	20.00	63	5.00	12.00	3.2	10.2		
	Hidratos de carbono***	g	38.80	73.5	9.70	14.00	6.208	11.9		
	Sodio	mg	144.00	315	36.00	60.00	23.04	51		
	Potasio	mg	376.00	840	94.00	160.00	60.16	136		
	Cloruros	mg	240.00	840	60.00	160.00	38.4	136		
	Calcio	mg	380.00	735	95.00	140.00	60.8	119		
	Fósforo	mg	208.00	525	52.00	100.00	33.28	85		
	Relación Ca/P		1.7:1	2:1	1.7:1	2:1	1.7:1	2:1		
	Vitamina A	U.I.	2800.00	6583.5	700.00	1254.00	448	1065.9		
	Vitamina A ER (Retinol)	µg	816.00	1995	204.00	380.00	130.56	323		
	Vitamina D	U.I.	292.00	525	73.00	100.00	46.72	85		
	Vitamina E (Alfa Tocoferol)	U.I.	12.00	63	3.00	12.00	1.92	10.2		
	Vitamina K	µg	32.80	131.25	8.20	25.00	5.248	21.25		
	Vitamina C	mg	53.60	194.25	13.40	37.00	8.576	31.45		

	Vitamina B1 (tiamina)	µg	240.00	1312.5	60.00	250.00	38.4	212.5				
	Vitamina B2 (riboflavina)	µg	560.00	2625	140.00	500.00	89.6	425				
	Niacina	µg	4000.00	7875	1000.00	1500.00	640	1275				
	Vitamina B6 (piridoxina)	µg	300.00	918.75	75.00	175.00	48	148.75				
	Acido fólico	µg	148.00	262.5	37.00	50.00	23.68	42.5				
	Acido pantoténico	µg	1800.00	9975	450.00	1900.00	288	1615				
	Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg	0.80	7.875	0.20	1.50	0.128	1.275				
	Biotina	µg	8.80	52.5	2.20	10.00	1.408	8.5				
Colina	mg	30.00	262.5	7.50	50.00	4.8	42.5					
Mioinositol	mg	16.00	210	4.00	40.00	2.56	34					
Magnesio	mg	28.00	78.75	7.00	15.00	4.48	12.75					
Hierro	mg	6.80	15.75	1.70	3.00	1.088	2.55					
Yodo	µg	24.00	236.25	6.00	45.00	3.84	38.25					
Cobre	µg	360.00	630	90.00	120.00	57.6	102					
Zinc	mg	4.40	7.875	1.10	1.50	0.704	1.275					
Manganeso	µg	28.00	131.25	7.00	25.00	4.48	21.25					
Selenio	µg	7.20	26.25	1.80	5.00	1.152	4.25					
Nucleótidos	mg	7.60	84	1.90	16.00	1.216	13.6					
Cromo	µg	6.00	52.5	1.50	10.00	0.96	8.5					
Molibdeno	µg	6.00	52.5	1.50	10.00	0.96	8.5					
Dilución 16%												
030.000.0003.00	Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 5.37 g. * Aunque no existe un nivel superior de recomendación siempre deberá conservar la relación de ácido linoleico/ácido linolenico. **DHA: Acido Docosahexaenoico. *** La lactosa y polímeros de glucosa deben ser los hidratos de carbono preferidos, sólo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 g/100 ml.											

SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO

Clave	Descripción								Indicaciones	Administración y dosis
030.000.0011.00	POLVO									
	Contenido en	Unidad	100 g		100 kcal		100 ml		Alimentación en recién nacidos de término y lactantes.	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
	Kilocalorías	kcal	509.00	528.00	100.00	100.00	66.00	68.00		
	Hidratos de carbono	g	55.20	57.90	10.00	14.00	7.00	7.64		
	Lípidos	g	25.80	28.90	4.40	6.00	3.41	3.71		
	Acido linoleico	%			8.00	35.00				
	Acido linoleico	g			0.30	1.40				
	Acido- α linolenico	%			1.60	5.00				

Acido- α linolenico	g			0.05	1.75		
Relación linoleico: alfa linolénico				5:1	16:1		
Acido araquidónico (ARA)	%			0.22	0.30		
Acido araquidónico	g			0.00	0.40		
Acido docosa- hexaenoico (DHA)	%			0.22	0.30		
Acido docosa- hexaenoico	g			0.00	0.02		
Relación ARA:DHA				1:1	2:1		
Proteínas	g	9.50	12.00	1.80	3.00	1.23	1.50
Taurina	Mg	0.00	36.00	0.00	12.00	0.00	4.60
Sodio	mg	118.00	140.00	22.50	27.00	15.00	18.00
Potasio	mg	440.00	552.00	84.00	105.00	56.67	71.00
Cloruros	mg	299.00	350.00	57.00	80.00	36.67	46.00
Calcio	mg	320.00	420.00	63.00	80.00	42.00	53.00
Fósforo	mg	160.00	233.00	31.00	44.00	21.00	30.00
Relación Calcio/ Fósforo				2:1	2:1		
L-Carnitina	mg			1.2	2.3		
Vitamina A		1560.00 UI	1998.00 UI	90 μ g	180 μ g	200.00 UI	253.09 UI
Vitamina D		310.00 UI	372.00 UI	1.50 μ g	2.5 μ g	40.00 UI	48.00 UI
Vitamina E		6.10 UI	16.00 UI	1.3 μ g	2.24 μ g	0.80 UI	2.10 UI
Vitamina K	μ g	40.00	55.00	7.70	10.00	5.00	7.00
Vitamina C	mg	43.00	60.00	8.00	12.00	5.50	7.60

Vitamina B1 (tiamina)	μ g	300.00	530.00	60.00	100.00	40.00	68.00
Vitamina B2 (riboflavina)	μ g	470.00	800.00	90.00	150.00	60.00	102.00
Niacina	μ g	3931.00	6250.00	750.00	1200.00	500.00	800.00
Vitamina B6 (piridoxina)	μ g	300.00	380.00	59.88	75.00	40.00	50.00
Acido fólico	μ g	39.00	80.00	10.00	50.00	5.00	10.20
Acido pantoténico	μ g	1651.00	2365.00	400.00	450.00	210.00	340.00
Vitamina B12 (cianocobalamina)	μ g	1.00	1.60	0.20	0.50	0.13	0.20
Biotina	μ g	11.00	23.00	2.00	7.5	1.50	3.00
Colina	mg	51.00	84.00	10.00	16.00	6.66	11.00
Inositol	mg	21.00	25.00	4.00	5.00	2.70	3.40
Magnesio	mg	32.00	40.00	6.08	7.70	4.00	5.10

Hierro	mg	4.00	9.50	0.80	2.00	0.50	1.20
Yodo	µg	32.00	78.00	6.08	15.00	4.00	10.00
Cobre	µg	310.00	473.00	60.00	89.00	40.00	61.00
Zinc	mg	3.00	4.00	0.60	0.76	0.40	0.51
Manganeso	µg	26.00	118.00	4.94	22.50	3.00	15.00
Selenio	µg			1.00	9.00		
Nucleótidos*	*Opcionales						
Dilución 12.80 - 15.00 %							
Envase con 400 a 454 g y medida de 4.30 a 4.50 g							

SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO SIN LACTOSA

Clave	Descripción							Indicaciones	Administración y dosis	
	POLVO									
030.000.0012.00	Contenido en: Nutrimentos	Unidad	100 g		100 Kcal		100 ml		Alimentación en recién nacidos y lactantes con intolerancia a la lactosa.	Oral. Niños 0-6 meses: 110 Kcal/Kg de peso corporal/día.
	Kilocalorías		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		
	Lípidos	g	502.0	522.00	100.00	100.00	66.66	68.00		
	Acido docosa-hexaenoico (DHA)	mg	25.0	28.0	4.40	5.40	3.33	3.65		
	Acido docosa-hexaenoico (DHA)	%			9.0	22.0				
	Acido araquidónico (ARA)	mg			0.220	0.270				
	Acido araquidónico (ARA)	%			9.0	22.0				
	Relación DHA/ARA				0.220	0.270				
	Acido linoléico	g			1:1	1:1				
	Acido linoléico	%			0.3	1.4				
	Acido alfa linolénico	mg			0	3				
	Acido alfa linolénico	%			50	SE				
	Relación Acido linoléico/ Acido alfa linolénico				0	3				
	Proteínas	g			5:1	15:1				
	Taurina	mg	11.0	14.0	2.25	3.00	1.45	1.86		
	Hidratos de carbono	g			0	12				
	Sodio	mg	54.9	55.6	10.70	14.00	7.20	7.35		
	Potasio	mg	123.0	170.0	24.00	34.00	16.00	23.00		
	Cloruros	mg	538.0	600.0	105.00	119.00	70.00	80.00		
	Calcio	mg	333.0	370.0	65.00	160.00	43.33	49.00		
Fósforo	mg	423.0	450.0	50.00	140.00	56.67	60.00			
		mg	273.0	300.0	25.00	100.00	36.00	40.00		

Relación Calcio/ Fósforo				1:1	2:1		
L-carnitina	mg			1.2	2.3		
Vitamina A		1500.0 UI	1923.0 UI	88.5 µg	112.5 µg	200.00 UI	250.00 UI
Vitamina D		300.0 UI	327.0 UI	1.48 µg	2.5 µg	40.00 UI	43.33 UI
Vitamina E		6.0 UI	13.7 UI	1.34 µg	2.98 µg	0.80 UI	1.80 UI
Vitamina K	µg	41.0	52.0	8.14	25.00	5.50	6.67
Vitamina C	mg	40.0	69.0	10.00	30.00	5.30	9.00
Vitamina B1 (tiamina)	µg	300.0	769.0	60.00	150.00	40.00	100.00

Vitamina B2 (riboflavina)	µg	345.0	1154.0	67.30	140.00	45.00	150.00
Niacina	µg	3800.0	5320.0	750.00	1500.00	500.00	700.00
Vitamina B6 (piridoxina)	µg	310.0	462.0	60.40	90.00	40.50	50.00
Acido fólico	µg	45.0	76.0	10.00	50.00	6.00	10.00
Acido pantoténico	µg	2280.0	2308.0	400.00	2000.00	300.00	300.00
Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg	1.1	1.5	0.20	0.30	0.15	0.20
Biotina	µg	11.0	22.8	2.20	7.50	1.50	3.00
Colina	mg	38.0	77.0	7.50	50.00	5.00	10.00
Inositol	mg	23.0	100.0	4.50	40.00	3.00	13.00
Magnesio	mg	31.1	50.0	6.06	10.00	4.10	7.00
Hierro	mg	6.0	9.2	1.20	2.00	0.80	1.20
Yodo	µg	25.0	77.0	10.00	50.00	3.30	10.00
Cobre	µg	300.0	460.0	60.00	89.66	40.00	60.00
Zinc	mg	3.8	4.6	0.70	1.50	0.50	0.60
Manganeso	µg	26.0	77.0	5.00	15.00	3.40	10.00
Selenio	µg			1.00	9.00		
Dilución 13.00 - 13.7 %							
Envase con 400 a 454 g y medida de 4.3 a 4.5 g							

VITAMINA E

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2715.00 010.000.2715.01	GRAGEA O CAPSULA Cada gragea o capsula contiene: Vitamina E 400 mg. Envase con 100 grageas o capsulas. Envase con 99 grageas o capsulas.	Antioxidante.	Oral. Adultos: 400 mg/día.

VITAMINAS A, C y D

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.1098.00	SOLUCION Cada ml contiene: Palmitato de Retinol 7000 a 9000 UI. Acido ascórbico 80 a 125 mg. Colecalciferol 1400 a 1800 UI. Envase con 15 ml.	Prevención y tratamiento de deficiencia de: Vitaminas A. Vitamina C. Vitamina D.	Oral. Niños: Dosis preventiva: Dos gotas cada 24 horas. Dosis terapéutica. Recién nacidos a 6 meses de edad: tres gotas cada 24 horas. 6 meses a 3 años: 4 gotas cada 24 horas. Repartidas en tres a cuatro tomas.

Catálogo**ACIDO ASCORBICO**

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5229.00	SOLUCION INYECTABLE Cada ampolleta contiene: Acido ascórbico 1 g. Envase con 6 ampolletas de 10 ml.	Profilaxis o tratamiento de la deficiencia de vitamina C. Antioxidante.	Intravenosa. Adultos: 1 a 2 g diarios. Niños: 25mg/kg/día.

ALANINA Y LEVOGLUTAMINA

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2742.00 010.000.2742.01	SOLUCION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: N-(2)-L-alanil- L-glutamina 20 g. equivalente a 8.20 g. de L-alanina y 13.46 g de L-glutamina. Envase con 50 ml. Envase con 100 ml.	Patologías que requieren adición de alanina y glutamina.	Intravenosa, en mezclas de nutrición parenteral. Adultos: 1.50 - 2.0 ml/kg de peso corporal ó 0.3 a 0.4 g de N-(2)-L- alanil-L-glutamina / kg de peso corporal.

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON HOMOCISTINURIA, RECIEN NACIDOS A 7 AÑOS 11 MESES DE EDAD

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y dosis
	POLVO					
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Homocistinuria.	Oral. Niños recién nacidos a 7 años 11 meses: Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	350.00	500.00		
	Proteína	g	15.00	28.60		
	Hidratos de carbono	g	51.00	62.00		
	Lípidos	g	0	26.00		
	L-Cistina	g	0.45	0.75		

	L-Histidina	g	0.41	1.16		
	L-Isoleucina	g	1.08	1.81		
	L-Leucina	g	1.68	3.10		
	L-Lisina	g	1.00	2.10		
	L-Metionina	g	0	trazas		
	L-Fenilalanina	g	0.68	1.37		
	L-Treonina	g	0.70	1.52		
	L-Triptófano	g	0.17	0.61		
	L-Tirosina	g	0.68	1.37		
	L-Valina	g	1.22	1.97		
	Tiamina (B1)	µg	1000.00	1900.00		
	Riboflavina (B2)	µg	900.00	1200.00		
Niacina (B3)		µg	10000.00	12800.00		
Piridoxina (B6)		µg	750.00	1000.00		
Cianocobalamina (B12)		µg	2.00	4.90		
Acido fólico		µg	100.00	230.00		
Acido pantoténico		µg	3700.00	6900.00		
Acido ascórbico (vit.C)		mg	50.00	135.00		
Colina		mg	60.00	110.00		
Biotina		µg	38.00	120.00		
Inositol		mg	40.00	86.00		
Vitamina A		UI	1400.00	1665.00		
Vitamina D		UI	300.00	480.00		
Vitamina E		UI	6.50	15.00		
Vitamina K		µg	35.00	50.00		
Sodio		mg	190.00	580.00		
Potasio		mg	560.00	840.00		
Cloro		mg	430.00	450.00		
Calcio		mg	575.00	810.00		
Fósforo		mg	400.00	810.00		
Magnesio		mg	50.00	200.00		
Hierro		mg	9.00	12.00		
Cobre		µg	860.00	2000.00		
Zinc		mg	8.00	13.00		
Manganeso		mg	0.38	1.30		
Yodo		µg	65.00	90.00		
Molibdeno		µg	12.00	45.00		
Selenio		µg	14.10	40.00		
010.000.5409.00 Envase: lata con medida dosificadora						

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON HOMOCISTINURIA, DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y dosis
	POLVO					
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Homocistinuria	Oral. Niños de 8 años o mayores y adultos: Dosis: Según la indicación del especialista
	Energía	kcal	340.00	410.00		
	Proteína	g	22.00	39.00		
	Hidratos de carbono	g	35.00	61.00		
	Lípidos	g	0	14.00		
	L-Cistina	g	0.81	1.18		
	L-Histidina	g	0.55	1.81		
	L-Isoleucina	g	1.56	2.82		
	L-Leucina	g	2.90	4.85		
	L-Lisina	g	1.78	3.30		
	L-Metionina	g	0	traza		
	L-Fenilalanina	g	0.92	2.14		

	L-Treonina	g	1.03	2.38		
	L-Triptófano	g	0.34	0.95		
	L-Tirosina	g	0.92	2.14		
	L-Valina	g	1.72	3.09		
	Tiamina (B1)	µg	1400.00	3250.00		
	Riboflavina (B2)	µg	1140.00	1800.00		
	Niacina (B3)	µg	13600.00	26000.00		
	Piridoxina (B6)	µg	1140.00	2100.00		
	Cianocobalamina (B12)	µg	2.90	5.00		
	Acido fólico	µg	410.00	500.00		
	Acido pantoténico	µg	5000.00	8000.00		
	Acido ascórbico (vit.C)	mg	57.00	90.00		
	Colina	mg	98.00	320.00		
	Biotina	µg	57.00	140.00		
	Inositol	mg	57.00	86.00		
	Vitamina A	UI	1730.00	2350.00		
	Vitamina D	UI	300.00	350.00		
	Vitamina E	UI	7.80	18.00		
Vitamina K		µg	41.00	70.00		
Sodio		mg	560.00	880.00		
Potasio		mg	700.00	1370.00		
Cloro		mg	560.00	1160.00		
Calcio		mg	670.00	880.00		
Fósforo		mg	670.00	760.00		

Magnesio	mg	163.00	285.00
Hierro	mg	13.00	23.50
Cobre	mg	1.00	1.43
Zinc	mg	13.00	13.80
Manganeso	mg	0.80	1.70
Yodo	µg	57.00	107.00
Molibdeno	µg	30.00	100.00
Selenio	µg	33.00	50.00
Cromo	µg	27.00	50.00
010.000.5410.00 Envase: lata con medida dosificadora.			

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA, RECIEN NACIDOS A 7 AÑOS 11 MESES DE EDAD

Clave	Descripción				Indicaciones	Via de administración
	POLVO					y dosis
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Trastornos del ciclo de la urea.	Oral. Niños recién nacidos a 7 años 11 meses de edad. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	Kcal	500.00	510.00		
	Proteína	g	6.50	7.50		
	Hidratos de carbono	g	57.00	60.00		
	Lípidos	g	24.60	26.00		
	L-Alanina	g	0	0		
	L-Arginina	g	0	0		
	L-Acido aspártico	g	0	0		
	L-Cistina	g	0.30	0.32		
	L-Acido glutámico	g	0	0		
	Glicina	g	0	0		
	L-Histidina	g	0.36	0.44		
	L-Isoleucina	g	0.99	1.28		
	L-Leucina	g	2.00	2.17		
	L-Lisina	g	1.11	1.24		
	L-Metionina	g	0.25	0.34		
	L-Fenilalanina	g	0.67	0.75		
	L-Treonina	g	0.75	0.85		
	L-Triptófano	g	0.38	0.39		
	L-Tirosina	g	0.80	0.88		
	L-Valina	g	0.99	1.43		
	Tiamina (B1)	mg	1.00	2.00		
	Riboflavina (B2)	mg	0.98	1.20		
	Niacina (B3)	µg	10000.00	16700.00		
	Piridoxina (B6)	mg	0.85	1.00		
	Cianocobalamina (B12)	µg	2.00	5.60		

	Acido fólico	µg	100.00	250.00		
	Acido pantoténico	µg	3.80	7.80		
	Acido ascórbico (vit.C)	mg	55.00	60.00		
	Colina	mg	60.00	100.00		
	Biotina	µg	38.00	75.00		
	Inositol	mg	50.00	86.00		
	Vitamina A	UI	533.00	1600.00		
	Vitamina D	UI	300.00	360.00		
	Vitamina E	UI	10.00	17.01		
	Vitamina K	µg	40.00	60.00		
	Sodio	mg	215.00	240.00		
	Potasio	mg	560.00	790.00		
	Cloro	mg	390.00	420.00		
	Calcio	mg	650.00	660.00		
	Fósforo	mg	440.00	455.00		
	Magnesio	mg	55.00	66.00		
	Cobre	µg	860.00	1250.00		
Zinc		mg	8.60	9.50		
Manganeso		µg	380.00	500.00		
Yodo		µg	76.00	80.00		
Selenio		µg	14.10	25.00		
010.000.5403.00 Envase: lata con medida dosificadora.						

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON TRASTORNO DEL CICLO DE LA UREA, DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y dosis
	POLVO					
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Trastornos del ciclo de la urea.	Oral Niños de 8 años o mayores y adultos. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	360.00	440.00		
	Proteína	g	8.20	25.00		
	Hidratos de carbono	g	45.00	71.00		
	Lípidos	g	0.00	17.00		
	L-Alanina	g	0	0		
	L-Arginina	g	0	0		
	L-Ácido aspártico	g	0	0		
	L-Cistina	g	0.26	1.20		
	L-Ácido glutámico	g	0	0		
	L-Histidina	g	0	0.72		

L-Isoleucina	g	0	2.56
L-Leucina	g	1.20	4.34
L-Lisina	g	1.57	4.20
L-Metionina	g	0.31	1.20
L-Fenilalanina	g	0.84	1.80
L-Prolina	g	0	0
L-Serina	g	0	0
L-Treonina	g	1.07	3.60
L-Triptófano	g	0.49	0.75
L-Tirosina	g	1.01	3.00
L-Valina	g	1.25	4.62
Tiamina (B1)	µg	0	4000.00
Riboflavina (B2)	µg	0	2400.00
Niacina (B3)	µg	0	30300.00

Piridoxina (B6)	µg	0	1750.00
Cianocobalamina (B12)	µg	0	7.30
Acido fólico	µg	0	530.00
Acido pantoténico	µg	0	10900.00
Acido ascórbico (vit.C)	mg	57.00	125.00
Colina	mg	0	130.00
Biotina	µg	0	150.00
Inositol	mg	0	110.00
Vitamina A	UI	0	3026.00
Vitamina D	UI	0	324.00
Vitamina E	UI	0	27.70
Vitamina K	µg	0	70.00
Sodio	mg	0	1175.00
Potasio	mg	0	1800.00
Cloro	mg	0	1325.00
Calcio	mg	0	1150.00
Fósforo	mg	0	1020.00
Magnesio	mg	0	300.00
Hierro	mg	0	17.00
Cobre	µg	0	1430.00
Zinc	mg	0	17.00
Manganeso	µg	0	1430.00
Yodo	µg	0	150.00
Molibdeno	µg	0	45.00
Selenio	µg	0	37.00
Cromo	µg	0	45.00

010.000.5404.00 Envase: lata con medida dosificadora

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON ACIDEMIA METILMALONICA Y PROPIONICA, DE RECIEN NACIDOS A 7 AÑOS 11 MESES DE EDAD

Clave	Descripción				Indicaciones	Via de administración y dosis
	POLVO					
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Acidemia metilmalónica o propiónica.	Oral. Niños recién nacidos a 7 años 11 meses de edad. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	350.00	500.00		
	Proteína	g	15.00	25.00		
	Hidratos de carbono	g	51.00	62.00		
	Lípidos	g	0	26.00		
	L-Cistina	g	0.29	0.95		
	L-Acido glutámico	g	0	2.86		
	L-Histidina	g	0.42	1.75		
	L-Isoleucina	g	0	0.12		
	L-Leucina	g	1.38	3.90		
	L-Lisina	g	1.00	2.65		
	L-Metionina	g	0	trazas		
	L-Fenilalanina	g	0.79	1.72		
	L-Treonina	g	0	0.10		
	L-Triptófano	g	0.17	0.76		
	L-Tirosina	g	0.79	1.72		
	L-Valina	g	0	trazas		
	Tiamina (B1)	mg	1.00	1.90		
	Riboflavina (B2)	mg	0.90	1.20		
	Niacina (B3)	mg	10.00	12.80		
	Piridoxina (B6)	mg	0.75	1.00		
	Cianocobalamina (B12)	µg	2.00	4.90		
	Acido fólico	µg	100.00	230.00		
	Acido pantoténico	mg	3.70	6.90		
	Acido ascórbico (vit.C)	mg	50.00	135.00		
	Colina	mg	60.00	110.00		
	Biotina	µg	38.00	120.00		
	Inositol	mg	40.00	86.00		
	Vitamina A-retinol	UI	1520.00	1665.00		
	Vitamina D	UI	380.00	480.00		

Vitamina E	UI	6.50	11.00
Vitamina K	µg	35.00	40.00
Sodio	mg	190.00	580.00
Potasio	mg	560.00	840.00
Cloro	mg	410.00	480.00
Calcio	mg	575.00	810.00
Fósforo	mg	400.00	810.00
Magnesio	mg	50.00	200.00
Hierro	mg	9.00	12.00
Cobre	mg	0.86	2.00
Zinc	mg	8.00	13.00
Manganeso	mg	0.38	1.30
Yodo	µg	65.00	90.00
Selenio	µg	14.10	40.00

010.000.5405.00 Envase: lata con medida dosificadora.

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON ACIDEMIA METILMALONICA Y PROPIONICA, DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS

Clave	Descripción				Indicaciones	Via de administración y dosis
	POLVO					
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Acidemia metilmalónica o propiónica.	Oral. Niños De 8 años o mayores y adultos Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	340.00	410.00		
	Hidratos de carbono	g	35.00	59.00		
	Lípidos	g	0	13.00		
	Proteína	g	21.00	39.00		
	L-Cistina	g	0.42	1.49		
	L-Histidina	g	0.65	2.74		
L-Isoleucina		g	0	0.24		
L-Leucina		g	0	3.40		
L-Lisina		g	2.00	4.18		
L-Metionina		g	0	trazas		
L-Fenilalanina		g	1.11	2.71		
L-Treonina		g	0.00	0.20		
L-Triptófano		g	0.34	1.21		
L-Tirosina		g	1.11	2.71		
L-Valina		g	0	trazas		
Tiamina (B1)		mg	1.20	3.25		
Riboflavina (B2)		mg	0.98	1.80		
Niacina (B3)		mg	13.6	22.00		
Piridoxina (B6)		mg	0.98	2.10		
Cianocobalamina (B12)		µg	2.40	5.00		
Acido fólico		µg	350.00	500.00		
Acido pantoténico		mg	4.80	8.00		
Acido ascórbico (vit.C)		mg	49.00	90.00		
Colina		mg	100.00	320.00		
Biotina		µg	49.00	140.00		
Inositol		mg	49.00	86.00		
Vitamina A		UI	1430.00	2350.00		
Vitamina D		UI	290.00	320.00		
Vitamina E		UI	7.80	12.10		
Vitamina K		µg	41.00	70.00		
Sodio		mg	560.00	880.00		
Potasio		mg	700.00	1370.00		
Cloro		mg	560.00	1160.00		
Calcio		mg	670.00	880.00		
Fósforo		mg	670.00	760.00		
Magnesio		mg	176.00	285.00		
Hierro		mg	12.20	23.50		
Cobre		µg	1000.00	1400.00		
Zinc		mg	12.20	13.60		
Manganeso		mg	0.80	1.70		
Yodo		µg	49.00	107.00		
Molibdeno		µg	30.00	100.00		
Selenio		µg	29.00	50.00		
Cromo		µg	27.00	50.00		
010.000.5406.00	Envase: lata con medida dosificadora.					

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ORINA DE JARABE DE MAPLE (ARCE), DE RECIEN NACIDOS A 7 AÑOS 11 MESES DE EDAD

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y dosis
	POLVO					
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Enfermedad de orina de jarabe de maple.	Oral. Niños recién nacidos a 7 años 11 meses de edad. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	350.00	500.00		
	Proteína	g	15.00	25.00		
	Hidratos de carbono	g	51.00	62.00		
	Lípidos	g	0	26.00		
	L-Alanina	g	1.28	2.55		
	L-Cistina	g	0.15	3.40		
	L-Histidina	g	0.42	1.49		
	L-Isoleucina	g	0	trazas		
	L-Leucina	g	0	trazas		

L-Lisina	g	1.00	2.69		
L-Metionina	g	0.30	0.63		

L-Fenilalanina	g	0.88	1.75		
L-Treonina	g	0.70	1.94		
L-Triptófano	g	0.17	0.77		
L-Tirosina	g	0.89	1.75		
L-Valina	g	0	trazas		
Tiamina (B1)	mg	1.00	1.90		
Riboflavina (B2)	mg	0.90	1.20		
Niacina (B3)	mg	10.00	12.80		
Piridoxina (B6)	mg	0.75	1.00		

Cianocobalamina (B12)	µg	2.00	4.90		
Acido fólico	µg	100.00	230.00		
Acido pantoténico	mg	3.80	6.90		
Acido ascórbico (vit.C)	mg	50.00	135.00		
Colina	mg	60.00	110.00		
Biotina	µg	38.00	120.00		
Inositol	mg	40.00	86.00		
Vitamina A	UI	1400.00	1665.00		
Vitamina D	UI	280.00	480.00		
Vitamina E	UI	6.50	15.00		
Vitamina K	µg	35.00	50.00		
Sodio	mg	190.00	580.00		
Potasio	mg	600.00	840.00		
Cloro	mg	325.00	500.00		
Calcio	mg	575.00	810.00		
Fósforo	mg	400.00	810.00		
Magnesio	mg	50.00	200.00		
Hierro	mg	9.00	12.00		
Cobre	mg	0.86	2.00		
Zinc	mg	8.00	13.00		
Manganeso	mg	0.38	1.30		
Yodo	µg	76.00	90.00		
Selenio	µg	14.10	40.00		

010.000.5407.00

Envase: lata con medida dosificadora.

ALIMENTO MEDICO PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ORINA DE JARABE DE MAPLE (ARCE), DE 8 AÑOS O MAYORES Y ADULTOS

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y dosis
	POLVO					
	Cada 100 g contiene	Unidad	Mínimo	Máximo	Enfermedad de orina de jarabe de maple.	Oral. Niños de 8 años o mayores y adultos. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	340.00	410.00		
	Proteína	g	24.00	39.00		
	Hidratos de carbono	g	35.00	57.00		
	Lípidos	g	0	14.00		
	L-Cistina	g	0.30	1.80		
	L-Histidina	g	0.84	2.33		
	L-Isoleucina	g	0	trazas		
	L-Leucina	g	0	trazas		
	L-Lisina	g	2.00	4.21		
	L-Metionina	g	0.60	0.99		
	L-Fenilalanina	g	1.49	2.74		
	L-Prolina	g	2.30	4.40		
	L-Serina	g	1.13	2.71		
	L-Treonina	g	1.22	3.04		
	L-Triptófano	g	0.34	1.22		
	L-Tirosina	g	1.78	3.90		
	L-Valina	g	0	trazas		
	Tiamina (B1)	mg	1.40	3.52		
	Riboflavina (B2)	mg	1.14	1.80		
	Niacina (B3)	mg	13.60	31.70		
	Piridoxina (B6)	mg	1.30	2.10		
	Cianocobalamina (B12)	µg	2.80	5.00		
	Acido fólico	µg	410.00	500.00		
	Acido pantoténico	mg	5.00	14.00		
	Acido ascórbico (Vit.C)	mg	57.00	90.00		
	Colina	mg	98.00	320.00		
	Biotina	µg	57.00	140.00		
	Inositol	mg	57.00	86.00		

Vitamina A	UI	1730.00	2350.00		
Vitamina D	UI	300.00	350.00		
Vitamina E	UI	7.80	12.10		
Vitamina K	µg	37.00	70.00		
Sodio	mg	560.00	880.00		
Potasio	mg	700.00	1370.00		
Cloro	mg	560.00	1020.00		
Calcio	mg	670.00	880.00		
Fósforo	mg	670.00	760.00		

Magnesio	mg	163.00	285.00
Hierro	mg	13.00	23.50
Cobre	mg	1.00	1.40
Zinc	mg	12.20	13.60
Manganeso	mg	0.80	1.70
Yodo	µg	57.00	107.00
Molibdeno	µg	30.00	100.00
Selenio	µg	28.00	50.00
Cromo	µg	27.00	50.00
010.000.5408.00 Envase: lata con medida dosificadora.			

AMINOACIDOS CRISTALINOS

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2512.00 010.000.2512.01	SOLUCION INYECTABLE AL 10% Pediátricos				Nutrición parenteral.	Intravenosa. Niños: Dosis según requerimientos.
	Cada 100 ml contiene:	Unidad	Mínimo	Máximo		
	L- Isoleucina	mg	670	820		
	L- Leucina	mg	1000	1400		
	L- Lisina	mg	670	1100		
	L- Metionina	mg	220	340		
	L- Fenilalanina	mg	420	650		
	L- Treonina	mg	370	512		
	L- Triptofano	mg	180	200		
	L- Valina	mg	670	1230		
	L- Histidina	mg	310	480		
	L- Cisteína	mg	16	250		
	L- Tirosina	mg	44	240		
	L- Alanina	mg	540	800		
	L- Arginina	mg	840	1230		
	L- Prolina	mg	300	820		
	L- Serina	mg	380	500		
	Glicina (Ac. Aminoacético)	mg	360	400		
	Acido L- Aspártico	mg	320	600		
	Acido L- Glutámico	mg	500	1000		
	Taurina	mg	25	70		
	Ornitina	mg	0	250		
	* Prosulfito o disulfito de sodio	mg	0	50		
	*Cloruros	Mm o l	0	16		
	* Agua inyectable	ml	0	100		
	Aminoácidos Totales	g/l	98	100		
	Nitrógeno total	g/l	15	15.68		
	* Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado.					
	Presentación de 250 ml.					
	Presentación de 500 ml.					

AMINOACIDOS CRISTALINOS

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y Dosis
	SOLUCION INYECTABLE AL 10% Adultos					
	Cada 100 ml contiene:	Unidad	Mínimo	Máximo	Para la preparación de mezclas de nutrición parenteral.	Intravenosa en infusión continua. Adultos: Dosis a criterio del especialista.
	L- Isoleucina	mg	490	720		
	L- Leucina	mg	719	940		
	L- Lisina	mg	599	720		
	L- Metionina	mg	294	440		
	L- Fenilalanina	mg	440	845		
	L- Treonina	mg	414	520		
	L- Triptofano	mg	153	210		
	L- Valina	mg	572	800		
	Histidina	mg	290	473		
	Cisteína o cistina	mg	0	110		
	Tirosina	mg	0	100		
	L- Alanina	mg	458	2040		
	L- Arginina	mg	505	1134		
	L- Prolina	mg	300	1174		
L- Serina		mg	420	1092		
*L- Taurina		mg	0	20		
Glicina (ac. Aminoacético)		mg	540	1280		
*Acido L- Aspártico		mg	0	481		
*Acido glutámico		mg	0	834		
*Acetato		mEq/l	0	74		
*Potasio		mEq/l	0	0.55		
Nitrógeno total.		g/l	15.5	16.5		
* Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado.						
010.000.2738.00 Presentación 500 ml.						

AMINOACIDOS CON ELECTROLITOS

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2737.00	SOLUCION INYECTABLE AL 8.5%				Para la preparación de mezclas de nutrición parenteral.	Intravenosa en infusión continua. Adultos y niños: Dosis a criterio del especialista.
	Cada 100 ml contiene:	Unidad	Mínimo	Máximo		
	L- Isoleucina	mg	400	620		
	L- Leucina	mg	520	810		

L- Lisina	mg	490	870
L- Metionina	mg	250	500
L- Fenilalanina	mg	380	720
L- Treonina	mg	340	460
L- Triptofano	mg	130	160
L- Valina	mg	390	680
Histidina	mg	240	380
Cisteína o cistina	mg	0	80
Tirosina	mg	30	50
L- Alanina	mg	390	1760
L- Arginina	mg	430	880
L- Prolina	mg	350	1000
L- Serina	mg	0	930
Glicina (ac. Aminoacético)	mg	460	1760
L- taurina	mg	0	200
Acetato de sodio	mEq/l	70	594
Potasio	mEq/l	60	66
Cloruro de magnesio	mg	0	102
Cloruro de sodio	mg	154	410
Fosfato dibásico de potasio	mg	400	522
*Acido L- Aspártico	mg	0	410
*Acido glutámico	mg	0	710
Nitrógeno total	g/l	13.5	16

* Pueden o no venir en la fórmula, lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado.

Presentación 500 ml.

AMINOACIDOS ENRIQUECIDOS CON AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5393.00	SOLUCION INYECTABLE				Para la preparación de mezclas de nutrición parenteral.	Intravenosa en infusión continua. Adultos y niños: Dosis a criterio del especialista.
	Cada 100 ml contiene	Unidad	Mínimo	Máximo		
	L- Isoleucina	mg	700	1380		
	L- Leucina	mg	1100	1580		
	L- Lisina	mg	265	690		
	L- Metionina	mg	110	450		
	L- Fenilalanina	mg	80	480		
	L- Treonina	mg	200	450		
	L- Triptofano	mg	70	130		
	L- Valina	mg	780	1240		
	Histidina	mg	150	280		
	Cisteína o cistina	mg	0	55		
	Tirosina	mg	0	33		
	L- Alanina	mg	395	660		
	L- Arginina	mg	464	1100		
	L- Prolina	mg	445	950		
	L- Serina	mg	220	575		
	Glicina (ac. Aminoacético)	mg	300	700		
	*Piro-sulfito de sodio	mg	0	50		
	Agua inyectable	ml	0	100		
	Aminoácidos de cadena ramificada	%	40	55		
* Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado						
010.000.5393.00 Presentación 500 ml						

AMINOACIDOS ESENCIALES SIN ELECTROLITOS

Clave	Descripción			Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2168.00	SOLUCION INYECTABLE al 8.5%			Para la preparación de mezclas de nutrición parenteral.	Intravenosa. Adultos y niños. Dosis a criterio del especialista.
	Cada 100 ml contienen en miligramos:				
	Aminoácidos esenciales	Mínimo	Máximo		
	L-fenilalanina	380	720.		
	L-isoleucina	400	620.		
	L-leucina	520	810.		
	L-lisina	490	870.		
	L-metionina	250	500.		
	L-treonina	340	460.		
	L-triptofano	130	160.		
	L-valina	390	680.		
	Aminoácidos no esenciales:				
	* Acido L-aspártico.	0	410.		
	* Acido L-glutámico	0	710.		
	Glicina (ácido amino acético)	460	1760.		
	L-alanina	390	1760.		
	L-arginina	430	880.		
	* L-cisteína	20	80.		
	L-histidina	240	380.		
	L-prolina	350	1000.		
	L-serina	370	930.		
	L-tirosina	30	50.		
	* Piro-sulfito de sodio	0	50.		
	* Metabisulfito de potasio agregado	0	60.		

CROMO

D-BIOTINA

DIETA ELEMENTAL

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5512838&fecha=12/02/2018

Taurina	mg	0.00	25.20	0.00	6.67
Carnitina	mg	0.00	25.20	0.00	6.67
Envase con 6 sobres con 79.5 a 80.4 g cada uno.					
Envase con 10 sobres con 79.5 a 80.4 g cada uno.					

DIETA POLIMERICA CON FIBRA

Clave	Descripción				Indicaciones	Via de administración y Dosis
010.000.5392.00	SUSPENSION ORAL O ENTERAL				Apoyo nutricio por sonda enteral o complementación vía oral.	Oral o Enteral. Adultos y niños. Dosis a criterio del médico.
	Cada 100 ml contienen:	Unidad	Mínimo	Máximo		
	Proteínas	g	3.69	3.74		
	Lípidos	g	3.45	3.56		
	Hidratos de carbono	g	11.90	15		
	Fibra dietaria total	g	1.25	1.35		
	Vitamina A	UI	359.3	400		

	Vitamina D	UI	20.0	28.7		
	Vitamina E	UI	2.8	3.3		
	Vitamina K1	µg	5.9	8		
	Vitamina C	mg	14.0	21.6		
	Tiamina B1	mg	0.16	0.2		
	Riboflavina B2	mg	0.19	0.24		
	Niacina	mg	2.16	2.8		
	Vitamina B6	mg	0.21			
	Acido fólico	µg	43.1	54		

Acido pantoténico	mg	1.0	1.4
Vitamina B12	µg	0.68	0.8
Biotina	µg	32.5	40
Colina	mg	43.1	45.2
Calcio	mg	65.5	66
Fósforo	mg	65.5	66
Magnesio	mg	26.7	31
Zinc	mg	1.3	1.5
Hierro	mg	1.1	1.2
Manganeso	mg	0.25	0.34
Iodo	µg	9	10
Sodio	mg	46.78	70.5
Potasio	mg	117.1	157
Cloruro	mg	93.5	126
Cromo	µg	3.74	6.7
Molibdeno	µg	10.2	11.2
Selenio	µg	3.74	4.7
Cobre	mg	0.13	0.14

Envase con 236 a 250 ml.

DIETA POLIMERICA SIN FIBRA

Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5391.00	SUSPENSION ORAL O ENTERAL				Apoyo nutricio por sonda enteral o complementación vía oral.	Oral o Enteral. Adultos y niños: Dosis a criterio del médico.
	Cada 100 ml contienen:	Unidad	Mínimo	Máximo		
	Proteínas	g	3.6	4		
	Lípidos	g	3.4	3.92		
	Hidratos de carbono	g	12.72	13.8		
	Vitamina A	U.I.	264.2	400		
	Vitamina D	U.I.	21.1	28		
	Vitamina E	U.I.	2.4	3.33		
	Vitamina K1	µg	4.2	8		
	Vitamina C	mg	9.7	15.9		
	Tiamina B1	mg	0.16	0.2		
	Riboflavina B2	mg	0.18	0.24		
	Niacina	mg	2.11	2.8		
	Vitamina B6	mg	0.21	0.4		
	Acido fólico	µg	42.3	54		
	Acido pantoténico	mg	1.06	1.4		
	Vitamina B12	µg	0.63	0.8		
	Biotina	µg	31.7	40		
	Colina	mg	31.3	45.2		
	Calcio	mg	49.4	75.4		
	Fósforo	mg	49.4	66		
	Magnesio	mg	19.8	37.7		
	Zinc	mg	0.32	0.99		
	Hierro	mg	0.89	1.13		
	Manganeso	mg	0.15	0.26		
	Iodo	µg	7	9.4		
	Sodio	mg	47	79		
	Potasio	mg	118	162		
	Cloruro	mg	93.5	134		
	Cromo	µg	3.77	5.1		
	Molibdeno	µg	7.5	12.2		
	Selenio	µg	3.77	5.1		
	Cobre	mg	0.09	0.16		
	Envase con 236 a 250 ml.					

FORMULA DE INICIO LIBRE DE FENILALANINA

Clave		Descripción			Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5400.00	POLVO					
	Contenido en:	Unidad	100 g			
			Mínimo	Máximo		
	Energía	kcal	470	550		
	Proteína	g	12.50	17.00		
Hidratos de carbono	g	50.00	60.00			
Fenilcetonuria.						Oral. Niños recién nacidos a 7 años 11 meses de edad: Dosis: Según la indicación del especialista.

Lípidos	g	20.00	26.00
L-Alanina	g	0	1.50
L-Arginina	g	0	1.50
L-Acido aspártico	g	0	1.50
L-Cistina	g	0.10	0.50
L-Acido glutámico	g	0	3.00
Glicina	g	0	1.00
L-Histidina	g	0.20	0.80
L-Isoleucina	g	0.50	1.50
L-Leucina	g	1.50	2.50
L-Lisina	g	0.50	1.50
L-Metionina	g	0.10	0.50
L-Fenilalanina	g	0.00	0.00
L-Prolina	g	0	1.50
L-Serina	g	0	1.00
L-Treonina	g	0.50	1.00
L-Triptófano	g	0.10	0.50
L-Tirosina	g	1.00	2.00
L-Valina	g	1.00	1.50
L-Carnitina	g	0	0.05
L-Taurina	g	0.01	0.05
L-Glutamina	g	0	0.20
Tiamina (B1)	mg	0.20	2.50
Riboflavina (B2)	mg	0.40	1.50
Niacina (B3)	mg	4.00	13.00
Piridoxina (B6)	mg	0.30	1.30
Cianocobalamina (B12)	µg	1.00	5.00
Acido fólico	µg	30.00	250.00
Acido pantoténico	mg	2.50	7.00
Acido ascórbico (Vit.C)	mg	30.00	70.00
Colina	mg	40.00	90.00
Biotina	µg	20.00	70.00
Inositol	mg	30.00	110.00
Vitamina A-retinol	U.I.	1400	1800
Vitamina D	U.I.	300	400
Vitamina E-alfa tocoferol	U.I.	3	12
Vitamina K	µg	15.00	55.00
Sodio	mg	100.00	250.00
Potasio	mg	400.00	700.00
Cloro	mg	250.00	350.00
Calcio	mg	300.00	700.00
Fósforo	mg	200.00	460.00
Magnesio	mg	25.00	70.00
Hierro	mg	5.00	12.00
Cobre	mg	0.20	1.50
Zinc	mg	3.00	10.00
Manganeso	mg	0.20	0.80
Yodo	µg	40.00	80.00
Molibdeno	µg	10.00	40.00
Selenio	µg	12.00	22.00
Cromo	µg	10.00	40.00

Envase: Lata o sobre. Con medida dosificadora

FORMULA DE SEGUIMIENTO LIBRE DE FENILALANINA

FORMULARIO DE RECETAS DE FARMACIA						
Clave	Descripción				Indicaciones	Vía de administración y dosis
	POLVO					
	Contenido en:	Unidades	100 g		Fenilcetonuria.	Oral. Niños de 8 años a adulto: Dosis: Según la Indicación del especialista.
			Mínimo	Máximo		
			Energía	kcal		
Proteína	g	20.00	35.00			
Hidratos de carbono	g	30.00	65.00			
Lípidos	g	0.10	15.00			
L-Alanina	g	0	2.00			
L-Arginina	g	0	2.50			
L-Acido aspártico	g	0	2.50			
L-Cistina	g	0.10	1.00			
L-Acido glutámico	g	0	4.00			
Glicina	g	0	2.30			

L-Histidina	g	0.30	1.50
L-Isoleucina	g	1.30	2.50
L-Leucina	g	2.50	3.50
L-Lisina	g	1.50	2.50
L-Metionina	g	0.30	0.80
L-Fenilalanina	g	0.00	0.00
L-Prolina	g	0	2.50
L-Serina	g	0.50	1.50
L-Treonina	g	0.80	1.80
L-Triptófano	g	0.20	0.80
L-Tirosina	g	2.00	3.50
L-Valina	g	1.50	2.60
L-Carnitina	g	0.01	0.05
L-Taurina	g	0.05	0.20
L-Glutamina	g	0.20	0.50
Tiamina (B1)	mg	1.00	3.50
Riboflavina (B2)	mg	1.00	2.00
Niacina (B3)	mg	10.00	25.00
Piridoxina (B6)	mg	0.80	2.00
Cianocobalamina (B12)	µg	2.00	6.00
Acido fólico	µg	240.00	500.00
Acido pantoténico	mg	3.50	8.50
Acido ascórbico (Vit.C)	mg	45.00	140.00
Colina	mg	90.00	120.00

	Biotina	µg	40.00	130.00		
	Inositol	mg	40.00	80.00		
	Vitamina A-retinol	UI	1400	1800		
	Vitamina D	UI	200	500		
	Vitamina E-alfa tocoferol	UI	4.00	12.50		
	Vitamina K	µg	30.00	60.00		
	Sodio	mg	550.00	900.00		
	Potasio	mg	800.00	1500.00		
	Cloro	mg	400.00	1000.00		
	Calcio	mg	700.00	910.00		
	Fósforo	mg	700.00	850.00		
	Magnesio	mg	150.00	250.00		
	Hierro	mg	10.00	15.00		
	Cobre	mg	0.50	2.00		
	Zinc	mg	10.00	15.00		
	Manganeso	mg	0.05	2.00		
	Yodo	µg	40.00	110.00		
	Molibdeno	µg	20.00	110.00		
	Selenio	µg	25.00	45.00		
	Cromo	µg	25	45.00		
010.000.5401.00 Envase: Lata o sobre. Con medida dosificadora.						

FORMULA LIBRE DE FENILALANINA PARA ADOLESCENTE Y ADULTO

Clave	Descripción			Indicaciones	Via de administración y Dosis
	POLVO				
	Contenido en:	Unidades	100 g	Fenilcetonuria.	Oral. Adolescentes y adultos. Dosis: Según la indicación del especialista.
	Energía	kcal	297		
Proteína	g	39			
Hidratos de carbono	g	34			
Lípidos	g	< 0.5			
L-Alanina	g	1.7			
L-Arginina	g	3.2			
L-Acido aspártico	g	3			
L-Cistina	g	1.2			
L-Acido glutámico	g	0			
Glicina	g	3			
L-Histidina	g	1.8			
L-Isoleucina	g	2.8			
L-Leucina	g	4.8			
L-Lisina	g	3.7			
L-Metionina	g	0.8			
L-Fenilalanina	g	0			
L-Prolina	g	3.4			
L-Serina	g	2.1			
L-Treonina	g	2.3			
L-Triptófano	g	0.9			
L-Tirosina	g	4.2			
L-Valina	g	3.1			
L-Carnitina	g	0.02			
L-Taurina	g	0.15			
L-Glutamina	g	5.2			
Tiamina (B1)	mg	1.4			

Riboflavina (B2)	mg	1.4
Niacina (B3)	mg	13.6
Piridoxina (B6)	mg	2.1
Cianocobalamina (B12)	µg	3.6
Acido fólico	µg	500
Acido pantoténico	mg	5
Acido ascórbico (Vit.C)	mg	90
Colina	mg	321
Biotina	µg	140
Inositol	mg	85.7
Vitamina A-retinol	UI	2364
Vitamina D	UI	312
Vitamina E-alfa tocoferol	UI	7.7
Vitamina K	µg	70
Sodio	mg	560

010.000.5402.00	Potasio	mg	700		
-	Cloro	mg	560		
0	Calcio	mg	670		
0	Fósforo	mg	670		
0	Magnesio	mg	285		
-	Hierro	mg	23.5		
5	Cobre	mg	1.4		
4	Zinc	mg	13.6		
0	Manganeso	mg	2.1		
2	Yodo	µg	107		
-	Molibdeno	µg	107		
0	Selenio	µg	50		
0	Cromo	µg	50		
Envase: Lata o sobre con medida dosificadora.					

FORMULA CON PROTEINA A BASE DE AMINOACIDOS

Clave	Descripción					Indicaciones	Vía de administración y Dosis
	POLVO						
	Contenido en	Unidad	100 g	100 ml	100 kcal	Alergia a la proteína de la leche de vaca con sintomatología persistente durante el tratamiento con fórmulas de proteína de hidrólisis extensa. Síndrome de malabsorción intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal. Intolerancia a múltiples proteínas de alimentos no lácteos.	Oral o sonda enteral. Niños recién nacidos a 12 meses de edad. Dosis: A criterio del especialista.
	Kilocalorías	kcal	475.00	71.25	100.00		
	Lípidos	g	23.00	3.45	4.85		
	Triglicéridos de cadena larga	%	95.00				
	Triglicéridos de cadena media	%	5.00				
	Hidratos de carbono	g	54.00	8.10	11.39		
	Proteínas	g	13.00	1.95	2.74		
	Taurina	g	0.03				
	L-glutamina	g	1.34				
	L-alanina	g	0.61				
	L-arginina	g	1.08				
	L-ácido aspártico	g	1.01				
	L-cistina	g	0.40				
	Glicina	g	0.95				
	L-histidina	g	0.62				
	L-isoleucina	g	0.95				
	L-leucina	g	1.63				
	L-lisina	g	1.11				
	L-metionina	g	0.26				
	L-fenilalanina	g	0.73				
	L-prolina	g	1.16				
	L-serina	g	0.71				
	L-treonina	g	0.80				
	L-triptofano	g	0.32				
	L-tirosina	g	0.73				
	L-valina	g	1.04				
L-carnitina	g	0.01					
Sodio	mg	120.00	18.00	25.26			

Potasio	mg	420.00	63.00	88.42
Cloro	mg	290.00	43.50	61.05
Calcio	mg	325.00	48.75	68.58

Fósforo	mg	230.00	34.50	48.53
Vitamina A	µg	528.00	79.20	111.41
Vitamina D	µg	8.50	1.28	1.79
Vitamina E	mg	3.30	0.50	0.70
Vitamina K	µg	21.00	3.15	4.43
Vitamina C	mg	40.00	6.00	8.44
Vitamina B1 (tiamina)	mg	0.39	0.06	0.08
Vitamina B2 (riboflavina)	mg	0.60	0.09	0.13
Niacina	mg	4.50	0.68	0.95
Vitamina B6 (piridoxina)	mg	0.52	0.08	0.11
Acido Fólico	µg	40.00	6.00	8.44
Acido pantoténico	µg	2.65	0.40	0.56
Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg	1.25	0.19	0.26
Biotina	µg	26.00	3.90	5.49
Colina	mg	50.00	7.50	10.55
Inositol	mg	100.00	15.00	21.10
Magnesio	mg	34.00	5.10	7.17
Hierro	mg	7.00	1.05	1.48
Yodo	µg	47.00	7.05	9.92
Cobre	µg	0.38	0.06	0.08
Zinc	mg	5.00	0.75	1.06
Selenio	µg	11.00	1.65	2.32
Cromo	µg	10.00	1.50	2.11
Molibdeno	µg	14.25	2.14	3.01
Manganeso	mg	0.38	0.06	0.08
Dilución 15.00%				

030.000.5398.00

Envase con 400 g y medida de 4.6 a 5.00 g

FORMULA DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA							
Clave	Descripción						
	POLVO						
	Contenido en	Unidad	100 g		100 kcals		100 ml
Nutrimentos		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
	Kilocal	457.00	470.00	100	100	66.00	70.00
Lípidos	g	20.108	28.2	4.4	6	2.90	4.20
A. Linoleico	mg	1371	6580	300	1400	198.00	980.00
A. Linolénico	mg	228.5	SE*	50	SE	33.00	SE*
Relac A. Linoleico/ A. α Linolénico		5:1	15:1	5:1	15:1	5:1	15:1
Proteína hidrolizada de caseína y/o suero Péptidos: 85% o más, de menos de 1,500 Daltons	g	10.2825	14.1	2.25	3	1.49	2.10
Hidratos de carbono*	g	45.7	65.8	10	14	6.60	9.80
Sodio	mg	91.4	282	20	60	13.20	42.00
Potasio	mg	447.86	752	98	160	64.68	112.00
Cloruros	mg	287.91	752	63	160	41.58	112.00
Calcio	mg	370.17	658	81	140	53.46	98.00
Fósforo	mg	187.37	470	41	100	27.06	70.00
Relación Ca/P		1:1	2:1	1:1	2:1	1:1	2:1
Vitamina A ER (Retinol) 1	µg	274.2	846	60	180	39.60	126.00
Vitamina D3 (Calciferol) 2	Mg	4.57	11.75	1	2.5	0.66	1.75
Vitamina E (α Tocoferol)	Mg	2.285	23.5	0.5	5	0.33	3.50
Vitamina K	µg	35.189	117.5	7.7	25	5.08	17.50
Vitamina C	mg	36.56	51.7	8	11	5.28	7.70
Vitamina B1 (tiamina)	µg	274.2	1410	60	300	39.60	210.00
Vitamina B2 (riboflavina)	µg	411.3	1880	90	400	59.40	280.00
Niacina	µg	3427.5	7050	750	1500	495.00	1050.00

Vitamina B6 (piridoxina)	µg	274.2	822.5	60	175	39.60	122.50
Acido fólico	µg	45.7	235	10	50	6.60	35.00
Acido pantoténico	µg	1828	9400	400	2000	264.00	1400.00
Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg	0.914	7.05	0.2	1.5	0.13	1.05
Biotina	µg	10.054	47	2.2	10	1.45	7.00
Colina	mg	34.275	235	7.5	50	4.95	35.00
Mioinositol	mg	18.28	188	4	40	2.64	28.00
Magnesio	mg	50.27	70.5	11	15	7.26	10.50
Hierro	mg	5.484	6.11	1.2	1.3	0.79	0.91

	Yodo	µg	45.7	235	10	50	6.60	35.00
	Cobre	µg	274.2	465.3	60	99	39.60	69.30
	Zinc	mg	2.285	7.05	0.5	1.5	0.33	1.05
	Manganeso	µg	31.99	235	7	50	4.62	35.00
	Carnitina	mg	9.14	14.1	2	3	1.32	2.10
	Selenio	µg	4.57	42.3	1	9	0.66	6.30
	Nucleótidos (Opcionales)	mg	8.683	75.2	1.9	16	1.25	11.20
	Cromo (Opcional)	µg	6.855	47	1.5	10	0.99	7.00
	Molibdeno (Opcional)	µg	6.855	47	1.5	10	0.99	7.00
	Taurina (Opcional)	mg	27.42	56.4	6	12	3.96	8.40
Dilución 14.5% a 15.00%								
030.000.0013.00	Envase con 400 a 450 g y medida de 4.30 a 4.50 g. * Aunque no existe un nivel superior de recomendación siempre deberá conservar la relación de ácido linoléico/ácido linolénico. ** Hidratos de carbono: la lactosa y los polímeros de glucosa deben ser los hidratos de carbono preferidos, solo podrán añadirse almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/o gelatinizados hasta un máximo de 30% del contenido total de hidratos de carbono y hasta un máximo de 2 g/100ml. Deberá evitarse el uso de sacarosa y/o adición de fructosa.							

FORMULA DE PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA CON TRIGLICERIDOS DE CADENA MEDIA

Clave 030.000.5394.00		Descripción POLVO			Indicaciones	Vía de administración y dosis
Contenido en:		Unidades	100 Kcal		Pacientes pediátricos con enfermedades digestivas que cursan con mala absorción de grasas como insuficiencia pancreática, fibrosis quística, colestasis crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, CUCI, linfangiectasia intestinal, abeta o hipobetalipoproteinemia, insuficiencia intestinal: síndrome de intestino corto, enteritis post radiación o quimioterapia, diarrea grave del lactante, otras alteraciones metabólicas que cursen con deficiencia primaria de carnitina o secundaria a la actividad disminuida de la carnitinpalmitoil-transferasa, alteraciones primarias de la beta oxidación de los ácidos grasos de cadena larga y muy larga.	Oral. Lactantes: Dosis: Según la indicación del especialista.
			Mínimo	Máximo		
Energía	Kcal/100 ml	60	70			
Grasas totales	g	4.4	6.0			
Triglicéridos de cadena media	%	40	55			
Acido linoleico	g	0.3	1.2			
Acido alfa linolénico	mg	50	No especificado			
Proteína hidrolizada de caseína y/o suero Péptidos: 85% o más, de menos de 1,500 Daltons	g	2.25	3.0			
Hidratos de carbono	g	9	14.0			
Sodio	mg	20	60.0			
Potasio	mg	60	160.0			
Cloruros	mg	50	160.0			
Calcio	mg	50	140.0			
Fósforo	mg	25	90.0			
Vitamina A	µg RE	60	180.0			
Vitamina D3	µg	1	2.5			
Vitamina E	mg a-TE	0.5	5.0			
Vitamina K	µg	4	25.0			
Vitamina C	mg	8	30.0			
Vitamina B1 (tiamina)	µg	60	300.0			
Vitamina B2 (riboflavina)	µg	80	400.0			
Niacina	µg	300	1500.0			
Vitamina B6 (piridoxina)	µg	35	175.0			
Acido fólico	µg	10	50.0			
Acido pantoténico	µg	384	2000.0			
Vitamina B12 (cianocobalamina)	µg	0.1	0.5			
Biotina	µg	1.5	7.5			
Colina	mg	7	50.0			
Inositol	mg	4	40.0			
Magnesio	mg	5	15.0			
Hierro	mg	0.3	1.3			
Yodo	µg	10	50.0			
Cobre	µg	35	80.0			
Zinc	mg	0.5	1.5			
Manganeso	µg	1	50.0			
Selenio	µg	1	9.0			
L-carnitina	mg	1.2	No especificado			
Envase con 400 a 454 g y medida dosificadora de 4.5 g						
Dilución	%	14.2	15.0			

FORMULA O DIETA INMUNORREGULADORA

Clave	Descripción			Indicaciones	Administración y dosis	
	POLVO O SUSPENSION ORAL			Apoyo nutricio enteral para pacientes en estado crítico, con padecimientos médicos, traumáticos o quirúrgicos con alteraciones inmunológicas secundarias.	Enteral a través de sonda. Adultos: Dosis a criterio del Especialista.	
	Contenido:	100 ml				
		Mínimo	Máximo			
	Energía	kcal	100.00			150.00
	Proteínas	g	5.60			9.63
	Hidratos de carbono	g	12.00			13.50
	Lípidos	g	2.20			6.80
	Sodio	mg	58.00			116.80
	Potasio	mg	106.00			187.20
	Vitamina C	mg	6.00			100.00
	Tiamina	mg	0.07			00.30
	Riboflavina	mg	0.08			0.25
	Niacina	mg	1.00			2.80
	Calcio	mg	50.00			100.00
	Hierro	mg	0.90			1.80
	Vitamina D	UI	20.00			40.00
	Vitamina B6	mg	0.14			1.00
	Acido fólico	µg	20.00			54.00
	Vitamina B12	µg	0.30			0.80

	Fósforo	mg	50.00	100.00	
	Yodo	µg	7.60	16.00	
	Magnesio	mg	20.00	40.00	
	Cobre	µg	0.20	3.00	
	Biotina	µg	15.00	40.00	
	Acido pantoténico	mg	0.50	1.40	
	Vitamina K	µg	4.00	40.00	
	Colina	mg	21.00	50.00	
	Cloruro	mg	0.26	174.00	
Manganeso	mg	0.20	0.40		
Cromo	µg	7.60	14.00		
Molibdeno	µg	7.60	22.00		
Vitamina A	UI	266.00	668.00		
Retinol equivalente	µg	79.90	270.00		
Vitamina E	UI	5.00	10.00		
Alfa Tocoferol	mg	4.03	6.67		
Zinc	mg	1.50	3.60		
Selenio	µg	10.00	10.00		
Arginina	mg	1250	1540		
Histidina	mg	90.00	216.00		
Isoleucina	mg	235	780		
Leucina	mg	437.00	1170.00		
Lisina	mg	277.00	620.00		
Metionina	mg	100.00	169.00		
Cistina o cisteína	mg	12.00	40.00		
Fenilalanina	mg	184.00	395.00		
Tirosina	mg	166.00	432.00		
Treonina	mg	150.00	338.00		
Triptofano	mg	34.00	85.00		
Valina	mg	0.74	946.00		
Alanina	mg	100.00	235.00		
Acido aspártico	mg	100.00	564.00		
Glutamina	mg	595.00	1490.00		
Acido glutámico	mg	290.00	1080.00		
Glicina	mg	63.00	196.00		
Prolina	mg	90.00	865.00		
Serina	mg	166.00	404.00		
Relación omega 6/ omega 3		1.3/1	2.5/1		
Osmolaridad mOsm/kg H2O		375	490		
010.000.5397.00	Presentación: Sobre con 123 g de polvo o lata con 250 ml.				

HIDROXOCOBALAMINA

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.1708.00	SOLUCION INYECTABLE Cada ampolleta o frasco ampula con solución o liofilizado contiene: Hidroxocobalamina 100 µg. Envase con 3 ampolletas de 2 ml o frasco ampula y diluyente.	Anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12.	Intramuscular. Adultos y niños: Inicial: 50 a 100 microgramos diarios o cada tercer día, por dos a cuatro semanas. Mantenimiento: 100 microgramos cada 30 o 60 días.

HIERRO AMINOQUELADO Y ACIDO FOLICO

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.1712.00	TABLETA Cada tableta contiene: Hierro aminoquelado equivalente a 30 mg de hierro elemental. Acido fólico 0.500 mg. Envase con 30 tabletas.	Anemia por deficiencia de hierro y ácido fólico.	Oral. Adultos: 1 tableta cada 12 horas.
	SUSPENSION ORAL Cada 100 ml contienen:		Oral. Niños:

010.000.1713.00 010.000.1713.01 010.000.1713.02	Hierro aminoquelado equivalente a 600 mg de hierro elemental. Acido fólico 10.0 mg. Envase con 60 ml y vasito dosificador. Envase con 100 ml y vasito dosificador. Envase con 120 ml y vasito dosificador.	6 a 12 años: 5 ml al día. Menores de 6 años: 2.5 ml al día.
---	---	--

LECHE DESCREMADA

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2167.00	POLVO Cada 100 g contienen: Proteínas 35.3 g. Hidratos de Carbono 51.7 g. Grasa 1.0 g. Envase con 400 a 500 g.	Dislipidemias, dietas hipoenergéticas.	Oral. Adultos y niños: En cada caso a juicio del médico. Valorar costo-beneficio real, antes de su prescripción.

LEVOCARNITINA

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2169.00 010.000.2169.01 010.000.2169.02	SOLUCION INYECTABLE Cada ampolla contiene: Levocarnitina 1 g. Envase con 5 ampollas de 5 ml. Envase con 25 ampollas de 5 ml. Envase con 50 ampollas de 5 ml.	Deficiencia de carnitina primaria o secundaria.	Intramuscular o intravenosa en soluciones de nutrición parenteral o directa. Adultos: De 3 a 5 g/día. Niños: De 1.5 a 3 g/día.
010.000.2171.00	TABLETA MASTICABLE Cada tableta contiene: Levocarnitina 1 g. Envase con 20 tabletas.		Oral. Adultos: De 3 a 5 g/día. Niños: De 1.5 a 3 g/día.

LIPIDOS INTRAVENOSOS

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2744.00	EMULSION INYECTABLE (LIPIDOS DE CADENA LARGA AL 20 %; OLIVA / SOYA) Cada 100 ml contienen: Aceite de oliva 16 g. Aceite de soya 4 g. Envase con 500 ml.	Prevención y tratamiento de la deficiencia de ácidos grasos esenciales. Para la preparación de mezclas de nutrición parenteral.	Intravenosa, preferentemente central. Adultos y niños. Dosis a criterio del especialista.
010.000.2731.00	EMULSION INYECTABLE (LIPIDOS DE CADENA LARGA AL 10%; SOYA O SOYA CARTAMO) Cada 500 ml contienen: Aceite de soya: 50 g o mezcla de aceite de soya - aceite de cártamo 25g/25g. Cada mililitro proporciona 1.1 Kcal. Envase con 500 ml.		
010.000.2740.00	EMULSION INYECTABLE (LIPIDOS DE CADENA MEDIANA Y LARGA AL 20%; SOYA / TRIGLICERIDOS) Cada 1000 ml contienen: Aceite de soya 100 g. Triglicéridos de cadena mediana 100 g. Cada ml proporciona 1.9 Kcal. Envase con 500 ml.		
010.000.5382.00	EMULSION INYECTABLE (LIPIDOS DE CADENA LARGA AL 20 %; SOYA O SOYA / CARTAMO) Cada 100 ml contienen: Aceite de soya 20 g. o mezcla de aceite de soya - aceite de cártamo 10 g/10 g. Cada ml proporciona 2 Kcal. Envase con 500 ml.		

LIPIDOS INTRAVENOSOS: ACEITE DE PESCADO (ACIDOS GRASOS)

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2745.00 010.000.2745.01	EMULSION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: Aceite de pescado 10.0 g. Envase con 50 ml. Envase con 100 ml.	Pacientes con apoyo nutricio vía parenteral que requieran dosis terapéuticas de ácidos grasos omega 3.	Intravenosa en infusión como constituyente de mezclas de nutrición parenteral. Adultos y niños: 10% al 20% del total de los lípidos recomendados ó 1 a 2 ml/kg de peso corporal, adicionados con otras soluciones de lípidos en las mezclas de nutrición parenteral.

MANGANESO

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5378.00	SOLUCION INYECTABLE Cada ampolla contiene: Manganeso 924 µg. Envase con 25 ampollas de 3 ml.	Deficiencia de manganeso. Pacientes con nutrición parenteral a largo plazo.	Intravenosa. Adultos: Dosis: 1 a 3 mg/día.

MULTIVITAMINAS

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5385.00 010.000.5385.01 010.000.5385.02	SOLUCION INYECTABLE INFANTIL Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Retinol (vitamina A) 2000.0 UI. Colecalfiferol (vitamina D3) 200.0 UI. Acetato de alfa Tocoferol	Prevención o tratamiento de deficiencias múltiples. Preparación de mezclas de nutrición parenteral.	Intravenosa. Adultos y niños: De acuerdo al requerimiento del paciente y la indicación médica.

	(vitamina E) 7.0 UI. Nicotinamida 17.0 mg. Riboflavina 1.4 mg. Clorhidrato de piridoxina equivalente a 1.0 mg. Dexpantenol equivalente a de ácido pantoténico. 5.0 mg Clorhidrato de tiamina equivalente a 1.2 mg de tiamina. ácido ascórbico 80.0 mg. Biotina 0.02 mg. Cianocobalamina 0.001 mg. Ácido fólico 0.14 mg. Vitamina K 0.2 mg. Envase con 1 frasco ampula y 1 ampolleta con 5 ml de diluyente. Envase con 5 frascos ampula y 5 ampolletas con 5 ml de diluyente. Envase con 10 frascos ampula y 10 ampolletas con 5 ml de diluyente.		
010.000.5384.00	SOLUCION INYECTABLE ADULTO Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Retinol (vitamina A) 3300.0 U. Colesterol (vitamina D3) 200.0 U. Acetato de Tocoferol. (vitamina E) 10.0 U. Nicotinamida 40.0 mg. Riboflavina 3.6 mg. Clorhidrato de piridoxina. equivalente a 4.0 mg de piridoxina. Dexpantenol equivalente a 15.0 mg de ácido pantoténico. Clorhidrato de tiamina, equivalente a 3.0 mg de tiamina. Ácido ascórbico 100.0 mg. Biotina 0.060 mg. Cianocobalamina 0.005 mg. Ácido fólico 0.400 mg. Envase con un frasco ampula y diluyente de 5 ml.		

NUTRICION PARENTERAL

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2733.00	EMULSION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20% Aceite purificado de soja y/o de Oliva 20.00 g. En el compartimiento de aminoácidos al 7 % con electrolitos: L-alanina 1.449 a 1.450 g. L-arginina 0.805 g. Glicina 0.721 a 0.722 g. L-histidina 0.335 a 0.336 g. L-iso-leucina 0.420 g. L-leucina 0.511 a 0.512 g. Clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.405 a 0.406 g de L-lisina L-metionina 0.280 g. L-fenilalanina 0.392 g. L-prolina 0.475 a 0.476 g. L-serina 0.350 g. L-treonina 0.294 a 0.295 g. L-triptofano 0.125 a 0.126 g. L-tirosina 0.028 g. L-valina 0.405 a 0.406 g. Acetato de sodio trihidratado 0.515 a 0.612 g. Fosfato dipotásico 0.522 g o Glicerofosfato de sodio pentahidratado 0.535 g y Cloruro de Potasio 0.448 g. Cloruro de sodio 0.188 g. Cloruro de magnesio hexahidratado 0.103 a 0.112 g. El compartimiento de glucosa al 25% y cloruro de calcio: Glucosa monohidratada equivalente a 25.00 g de glucosa anhidra. Cloruro de calcio dihidratado 0.066 a 0.075 g. Envase con bolsa de plástico de 2000 ml con tres compartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio).	Apoyo nutricional en pacientes con vía enteral no apta para la nutrición.	Intravenosa, catéter venoso central. Adultos y niños: De acuerdo con las indicaciones del especialista.

	EMULSION INYECTABLE Cada 100 ml contienen:	Alimentación oral o enteral insuficiente, imposible o	Intravenosa, por catéter venoso central. Adultos y niños:
--	--	--	--

010.000.2734.00	En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%. Aceite purificado de soja y/o de Oliva 20.00 g. En el compartimiento de aminoácidos al 8.5% con electrolitos:	contraindicada.	De acuerdo con las necesidades metabólicas, el gasto energético y el estado clínico del paciente.
	L-alanina 1.760 g. L-arginina 0.978 g. Glicina 0.875 a 0.876 g. L-histidina 0.408 g. L-isoileucina 0.510 g. L-leucina 0.620 a 0.621 g. Clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.492 a 0.493 g. de L-lisina L-metionina 0.340 g. L-fenilalanina 0.475 a 0.476 g. L-prolina 0.578 g. L-serina 0.425 g. L-treonina 0.357 a 0.358 g. L-triptofano 0.152 a 0.153 g. L-tirosina 0.034 0.035 g. L-valina 0.492 a 0.493 g. Acetato de sodio trihidratado 0.594 a 0.612 g. Fosfato dipotásico 0.522 g o Glicerofosfato de sodio pentahidratado 0.535 g y Cloruro de Potasio 0.448 g. Cloruro de sodio 0.154 g. Cloruro de magnesio hexahidratado 0.102 a 0.112 g. El compartimiento de glucosa al 30% y cloruro de calcio: Glucosa monohidratada equivalente a 30.00 g de glucosa anhidra Cloruro de calcio dihidratado 0.066 a 0.075 g. Envase con bolsa de plástico de 2000 ml con tres compartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio).		

NUTRICION PARENTERAL

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y dosis
010.000.5388.00	EMULSION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de glucosa al 11%: Glucosa monohidratada equivalente a 11.00 g de glucosa anhidra. En el compartimiento de aminoácidos al 11% con electrolitos: L-Alanina 1.600 g. L-Arginina 1.130 g. L-Acido aspártico 0.340 g. L-Acido glutámico 0.560 g. L-Glicina (ácido aminocético) 0.790 g. L-Histidina 0.680 g. L-Isoleucina 0.560 g. L-Leucina 0.790 g. Clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.900 g de L-lisina. L-Metionina 0.560 g. L-Fenilalanina 0.790 g. L-Prolina 0.680 g. L-Serina 0.450 g. L-Treonina 0.560 g. L-Triptofano 0.190 g. L-Tirosina 0.023 g. L-Valina 0.730 g. Cloruro de calcio dihidratado equivalente a 0.074 g de cloruro de calcio. Glicerofosfato de sodio 0.504 g Sulfato de magnesio. 0.160 g Heptahidratado equivalente a de sulfato de magnesio. Cloruro de potasio 0.597 g. Acetato de sodio trihidratado equivalente a 0.490 g de acetato de sodio. En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%. Aceite de soja purificado 20.0 g. Envase con bolsa de plástico de 1440 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 885 ml, Aminoácidos al 11% con electrolitos 300 ml y lípidos al 20% 255 ml).	Alimentación parenteral.	Intravenosa por infusión periférica. Adultos y niños mayores de 2 años de edad: Dosis: 40 ml/kg de peso corporal/24 horas. La dosis puede variar de acuerdo al estado nutricional del paciente. Rotación del sitio de la infusión para disminuir riesgo de tromboflebitis.

	EMULSION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: En el compartimiento de emulsión de glucosa al 11%: Glucosa monohidratada equivalente a 11.00 g		
--	--	--	--

010.000.5389.00	de glucosa anhidra En el compartimiento de aminoácidos al 11% con electrolitos: L-Alanina 1.600 g. L-Arginina 1.130 g. L-Acido aspártico 0.340 g. L-Acido glutámico 0.560 g. L-Glicina (ácido aminoacético) 0.790 g. L-Histidina 0.680 g. L-Isoleucina 0.560 g. L-Leucina 0.790 g. Clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.900 g de L-lisina. L-Metionina 0.560 g. L-Fenilalanina 0.790 g. L-Prolina 0.680 g. L-Serina 0.450 g. L-Treonina 0.560 g. L-Triptofano 0.190 g. L-Tirosina 0.023 g. L-Valina 0.730 g. Cloruro de calcio dihidratado equivalente a 0.074 g de cloruro de calcio. Glicerofosfato de sodio 0.504 g. Sulfato de magnesio. Heptahidratado equivalente a 0.160 g de sulfato de magnesio. Cloruro de potasio 0.597 g Acetato de sodio trihidratado. equivalente a 0.490 g de acetato de sodio. En el compartimiento de emulsión de lípidos al 20%. Aceite de soya purificado 20.0 g. Envase con bolsa de plástico de 2400 ml con tres compartimientos (Glucosa 11% 1475 ml, Aminoácidos al 11% con electrolitos 500 ml y lípidos al 20% 425 ml).		
-----------------	--	--	--

NUTRICION PARENTERAL A BASE DE LIPIDOS, AMINOACIDOS, GLUCOSA, ELECTROLITOS

010.000.2730.00 010.000.2730.01 010.000.2730.02 010.000.2730.03	EMULSION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: En el compartimiento A de emulsión de lípidos al 20% Aceite purificado de soya y Aceite de Oliva 20.00 g En el compartimiento B de aminoácidos al 10 % con electrolitos: L-alanina 2.070 g L-arginina 1.150 g Glicina 1.030 g L-histidina 0.480 g L-isoleucina 0.600 g L-leucina 0.730 g Clorhidrato de L-lisina equivalente a 0.580 g de L-lisina L-metionina 0.400 g L-fenilalanina 0.560 g L-prolina 0.680 g L-serina 0.500 g L-treonina 0.420 g L-triptófano 0.180 g L-tirosina 0.040 g L-valina 0.580 g Acetato de sodio trihidratado 0.612 g Glicerofosfato de sodio Pentahidratado 0.535 g Cloruro de Potasio 0.448 g Cloruro de sodio* 0.118 g Cloruro de magnesio hexahidratado 0.112 g El compartimiento C de glucosa al 40% y cloruro de calcio: Glucosa monohidratada equivalente a 40.00 g de glucosa anhidra. Cloruro de calcio dihidratado 0.075 g *Con o sin cloruro de sodio Envase con bolsa de plástico de 2000 ml con tres compartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio). Envase con bolsa de plástico de 1000 ml con tres compartimientos (200 ml para lípidos, 400 ml para aminoácidos con electrolitos, 400 ml para glucosa con calcio). Envase con bolsa de plástico de 1500 ml con tres compartimientos (300 ml para lípidos, 600 ml para aminoácidos con electrolitos, 600 ml para glucosa con calcio). Envase con bolsa de plástico de 2500 ml con tres compartimientos (500 ml para lípidos, 1000 ml para aminoácidos con electrolitos, 1000 ml para glucosa con calcio).	Alimentación parenteral especializada. Cuando la alimentación oral o enteral es insuficiente, imposible o contraindicada.	Intravenosa, catéter venoso central. Adultos mayores de 18 años de edad: De acuerdo con las necesidades metabólicas, el gasto energético y el estado clínico del paciente.
--	---	--	---

	Cada 100 ml contiene: En el compartimiento de emulsión de lípidos al 10%:	Para pacientes cuando la alimentación oral o enteral es	Intravenosa por infusión periférica. Adultos
--	---	--	--

030.000.6128.00 030.000.6128.01 030.000.6128.02 030.000.6128.03	Aceite de soya/Aceite de oliva	10.0g	imposible, insuficiente o está contraindicada.	De acuerdo con las necesidades metabólicas, el gasto energético y el estado clínico del paciente.
	En el compartimiento de aminoácidos cristalinos con electrolitos:			
	L-Alanina	1.140 g		
	L-Arginina	0.632 g		
	Glicina	0.568 g		
	L-Histidina	0.265 g		
	L-isoleucina	0.330 g		
	L-Leucina	0.402 g		
	Clorhidrato de L-Lisina	0.400 g		
	equivalente a de L-Lisina	0.320 g		
	L-Metionina	0.220 g		
	L-Fenilalanina	0.308 g		
	L-Prolina	0.375 g		
	L-Serina	0.275 g		
	L-Treonina	0.230 g		
	L-Triptófano	0.100 g		
	L-Tirosina	0.022 g		
	L-Valina	0.320 g		
	Acetato de sodio trihidratado	0.245 g		
	Glicerofosfato de sodio pentahidratado	0.535 g		
	Cloruro de potasio	0.298 g		
	Cloruro de magnesio hexahidratado	0.112 g		
	En el compartimiento de glucosa al 20% y cloruro de calcio:			
	Glucosa monohidratada			
	equivalente a de glucosa anhidra	20.00 g		
	Cloruro de calcio dihidratado	0.075 g		
	Envase con bolsa de plástico de 1,000 ml, con tres compartimientos (200 ml para lípidos, 400 ml para aminoácidos con electrolitos, 400 ml para glucosa con calcio).			
	Envase con bolsa de plástico de 1,500 ml, con tres compartimientos (300 ml para lípidos, 600 ml para aminoácidos con electrolitos, 600 ml para glucosa con calcio).			
	Envase con bolsa de plástico de 2,000 ml, con tres compartimientos (400 ml para lípidos, 800 ml para aminoácidos con electrolitos, 800 ml para glucosa con calcio).			
	Envase con bolsa de plástico de 2,500 ml, con tres compartimientos (500 ml para lípidos, 1,000 ml para aminoácidos con electrolitos, 1,000 ml para glucosa con calcio).			

OLIGOMETALES ENDOVENOSOS

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5381.00	SOLUCION INYECTABLE Cada 100 ml. Contienen:	Prevención de deficiencia de oligometales en pacientes que reciben nutrición parenteral total prolongada.	Intravenosa. Adultos: A juicio del especialista y de acuerdo al caso.
	Cloruro de Zinc 55.0 mg.		
	Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg.		
	Sulfato de manganeso 38.10 mg.		
	Yoduro de sodio 1.30 mg.		
	Fluoruro de sodio 14.0 mg.		
	Cloruro de sodio 163.9 mg.		
	Cada frasco ampula proporciona en electrolitos:		
	Zinc 0.1614 mEq.		
	Cobre 0.0271 mEq.		
	Manganeso 0.0902 mEq.		
	Sodio 4.5493 mEq.		
	Sulfato 0.1172 mEq.		
	Yodo 0.0017 mEq.		
	Flúor 0.0666 mEq.		
	Cloro 0.7223 mEq.		
	Envase con 10 frascos ampula de 20 ml.		

SACARATO FERRICO

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.1714.00	SOLUCION INYECTABLE La ampollita contiene:	Anemia por deficiencia de hierro en: Pacientes sometidos a hemodiálisis. Problemas de absorción intestinal de hierro. Tratamiento con eritropoyetina.	Infusión intravenosa. Adultos: 100 mg/día en 100 ml de solución de cloruro de sodio al 0.9% durante 15-30 min.
	Complejo de sacarato de óxido férrico equivalente a 100 mg de hierro elemental. Envase con 1 ampollita de 5 ml.		

SELENIO

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.4378.00	SOLUCION INYECTABLE Cada ml contiene	Deficiencia de selenio en pacientes con alimentación parenteral total. Enfermedad de Keshan.	Intravenosa. Adultos: 100-200 µg/día. Niños: 3 µg/kg de peso corporal/día.
	Selenio 40.0 mg. Envase con un frasco ampula con 10 ml.		

TIAMINA

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5395.00	SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ampula con liofilizado contiene:	Beriberi. Anemia secundaria a deficiencia de tiamina. Polineuritis. Alcoholismo.	Intramuscular profunda y lenta. Adultos: De 10 a 500 mg/día. Niños: 10 a 50 mg/día.
	Clorhidrato de tiamina 500 mg. Envase con 3 frascos ampula.		

		Embarazo. Pelagra.	
--	--	-----------------------	--

VITAMINA A

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2191.00	CAPSULA Cada cápsula contiene: Vitamina A 50 000 UI. Envase con 40 cápsulas.	Deficiencia grave de vitamina A con xeroftalmia.	Oral. Adultos y niños mayores de 8 años: 300 000 UI diarias por tres días, subsecuente 50 000 UI diarias por 14 días. Sostén 10 000 UI diarias por dos meses.
020.000.3835.00 020.000.3835.01	SOLUCION Cada dosis contiene: Palmitato de vitamina A (retinol) 200 000 UI. Envase con 25 dosis. Envase con 50 dosis.		Oral. Niños mayores de un año: 200,000 UI cada 4 a 6 meses y a juicio del especialista. Para uso exclusivo en la campaña de vacunación, de la Semana de Salud.

VITAMINAS Y MINERALES

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.2709.00	SUSPENSION O SOLUCION ORAL Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de tiamina equivalente a 110.0 mg de tiamina. Riboflavina 5-fosfato sódica Equivalente a 120.0 mg de riboflavina. Clorhidrato de piridoxina equivalente a 150.0 mg de piridoxina. Cianocobalamina 0.11 mg. Acido fólico 7500 µg. Acido ascórbico 6000 mg. Sulfato ferroso desecado equivalente a 2000 mg de hierro. Sulfato de zinc monohidratado equivalente a 2000 mg de zinc. Envase con frasco gotero de 30 ml.	Pacientes con riesgo de deficiencias específicas o con patologías por las deficiencias.	Oral. Niños menores de 12 años: 1 ml al día.

010.000.2710.00	TABLETA Cada tableta contiene: Monohidrato de tiamina al 33.3% equivalente a 2.4 mg de tiamina. Rivoflavina al 33% equivalente a 2.7 mg de riboflavina. Clorhidrato de piridoxina equivalente a 3.2 mg de piridoxina. Cianocobalamina al 0.1% equivalente a 3.9 µg de vitamina B12. Acido fólico 420.0 µg. Acido ascórbico al 90% equivalente a 143.0 mg de vitamina C. Sulfato ferroso desecado equivalente a 30.0 mg de hierro. Sulfato de zinc monohidratado equivalente a 38.0 mg de zinc. Sulfato de cobre pentahidratado equivalente a 2.3 mg de cobre. Envase con 30 tabletas.		Oral. Mujeres embarazadas o lactando: 1-2 tabletas al día.
010.000.2716.00	SUSPENSION ORAL Cada 100 ml contienen: Rivoflavina (vitamina B2) 0.18000 g. Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 0.16500 g. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 0.22500 g. Acido fólico 0.01125 g. Ascorbato de sodio 9.00000 g. Fumarato ferroso, equivalente a 2.50000 g de hierro. Sulfato de zinc, equivalente a 2.50000 g de zinc. Cianocobalamina (vitamina B12) 0.16500 mg. Envase con frasco de vidrio de 30 ml con gotero integrado de 0.5 y 1.0 ml.		Oral. Niños menores de 12 años: 1 ml al día. Programa de salud y nutrición de los pueblos indígenas.

010.000.2717.00	TABLETA Cada tableta contiene: Rivoflavina (vitamina B2) 4.0500 mg. Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 3.6000 mg.		Oral. Mujeres embarazadas o lactando: 1-2 tabletas al día. Programa de salud y nutrición de los pueblos indígenas.
-----------------	--	--	---

	Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 4.8000 mg. Acido fólico 0.6300 mg. Ascorbato de sodio 214.0000 mg. Fumarato ferroso 114.0000 mg. (equivalente a de hierro). 37.500 mg Sulfato de zinc 208.8067 mg. (equivalente a de zinc). 47.500 mg Sulfato de cobre 12.8993 mg. (equivalente a de cobre) 2.875 mg Cianocobalamina (vitamina B12) 0.00585 mg. Envase con 30 tabletas.		
010.000.2711.00	SOLUCION ORAL Cada 100 ml contienen: Rivoflavina 5-fosfato de sodio equivalente a 0.060 g de riboflavina (vitamina B2). Clorhidrato de tiamina (vitamina B1) 0.055 g. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 0.075 g. Cianocobalamina (vitamina B12) 0.055 mg. Acido fólico 3.750 mg. Acido ascórbico (vitamina C) 3.0 g. Sulfato ferroso heptahidratado (4.978 g). equivalente a 1.0 g de hierro elemental. Sulfato de zinc monohidratado (2.744 g) equivalente a 1.0 g de zinc elemental Envase con 60 ml y gotero de 2 ml.	Oral. Niños de 6-24 meses: 2 ml al día. Programa de salud y nutrición de los pueblos indígenas.	
010.000.2712.00	CAPSULA DE GELATINA BLANDA Cada cápsula de gelatina blanda contiene: Monohidrato de tiamina (vitamina B1) 2.4 mg. Riboflavina (vitamina B2) 2.7 mg. Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 3.2 mg. Cianocobalamina (vitamina B12) 3.9 µg. Acido fólico 420.0 µg. Acido ascórbico (vitamina C) 143.0 mg. Sulfato ferroso anhidro (equivalente a 30.0 mg de hierro) 81.6 mg. Sulfato de cobre anhidro (equivalente a 2.3 mg. de cobre) 5.77 m.g Sulfato de zinc anhidro (equivalente a 38.0 mg de zinc) 93.83 mg. Envase con 30 cápsulas de gelatina blanda.	Oral. Mujeres embarazadas o lactando: Una cápsula al día. Programa de salud y nutrición de los pueblos indígenas.	

ZINC

Clave	Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
010.000.5379.00	SOLUCION INYECTABLE Cada ampolleta contiene: Sulfato de zinc heptahidratado Equivalente a 5 mg de zinc elemental. Envase con 25 ampolletas de 3 ml.	Deficiencia de zinc. Síndrome de absorción intestinal deficiente. Acrodermatitis enterohéptica.	Infusión intravenosa lenta. Adultos: 12 a 15 mg/día. Niños: 100 ucg/kg/día.

México, Ciudad de México, a 26 de enero de 2018.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Edición 2017 del Cuadro Básico y Catálogo de Nutriología.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, **Jesús Añer Rodríguez**.- Rúbrica.

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.

IMPRIMIR

